

УДК 574.58:592(470.325)  
DOI 10.52575/2658-3453-2021-3-3-270-283

**Макрофауна беспозвоночных  
водной экосистемы участка «Острасьевы яры»  
государственного природного заповедника «Белогорье»  
по данным 2004–2007 гг.**

**А.Е. Силина<sup>1</sup>, И.А. Будаева<sup>2</sup>, Е.Ю. Аникеенко<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Государственный природный заповедник «Белогорье»,  
Россия, 309342, Белгородская обл., п. Борисовка, пер. Монастырский, д. 3

<sup>2</sup> Воронежский государственный университет,  
Россия, 394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1  
E-mail: allasilina@list.ru; irbudaeva@yandex.ru

**Аннотация.** Водная экосистема участка «Острасьевы яры» государственного природного заповедника «Белогорье» относится к бассейну Днепра. Работа по инвентаризации фауны данной экосистемы начата авторами в 2004 году, поскольку родниково-ручьевые экосистемы Центрального Черноземья России до этого периода были недостаточно изученными, исследования здесь охватывали преимущественно бассейн Верхнего Дона. Целью данной работы было выявление видового состава, доминирующих видов и групп макрозообентоса и зоофитоса в различных участках русла ручья урочища Острасьевы яры. В результате исследований 2004–2007 гг. выявлено 135 видов беспозвоночных, из них в верховье – 53 вида, в среднем течении – 53, в низовье – 66. Доминировали насекомые, составившие 68,3 % от числа собранных животных, среди которых наиболее массовыми были двукрылые и веснянки. Массовыми видами являлись моллюски *Pseudeupera arcidens* (Krivoshchina, 1978) и веснянки *Nemoura cinerea* Retzius, 1783. Впервые для фауны Центрального Черноземья указаны 3 вида беспозвоночных: клещи *Arrenurus mulleri* Koenike, 1901 и психодиды (двукрылые) – *Satchelliella trivialis* (Eaton, 1893) и *Ulomyia cognata* (Eaton, 1893). В последнее десятилетие на участке «Острасьевы яры» активизировалась деятельность бобра, что привело к значительным изменениям родниково-ручьевой системы. Поэтому полученные данные в исследовании 2004–2007 гг. могут быть использованы в качестве фоновых при оценке зоогенного влияния на макрозообентос родниково-ручьевой экосистемы.

**Ключевые слова:** водные беспозвоночные, олигохеты, пиявки, моллюски, клещи, насекомые.

**Для цитирования:** Силина А.Е., Будаева И.А., Аникеенко Е.Ю. 2021. Макрофауна беспозвоночных водной экосистемы участка «Острасьевы яры» государственного природного заповедника «Белогорье» по данным 2004–2007 гг. *Полевой журнал биолога*, 3 (3): 270–283. DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-3-270-283

*Поступила в редакцию 9 июля 2021*

**Macrofauna of Invertebrates  
in Aquatic Ecosystem of Site "Ostrasyevy Yary"  
of the Belogorye State Nature Reserve According to Data from 2004–2007**

**Alla E. Silina<sup>1</sup>, Irina A. Budaeva<sup>2</sup>, Elena Yu. Anikeenko<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Belogorye State Nature Reserve,  
3 Monastyrskiy Ln, Borisovka vill., Belgorod Region, 309340, Russia

<sup>2</sup> Voronezh State University,  
1 Universitetskaya Sq., Voronezh, 394018, Russia  
E-mail: allasilina@list.ru; irbudaeva@yandex.ru

**Abstract.** The aquatic ecosystem of the Ostrasyovy Yary site of the Belogorye State Nature Reserve belongs to the Dnieper basin. The work on the inventory of the fauna of this ecosystem was started by the

authors in 2004, since the spring-stream ecosystems of the Central Chozem Region of Russia were insufficiently studied before this period, research here mainly covered the Upper Don basin. The purpose of this work was to identify the species composition, dominant species and groups of macrozoobenthos and zoophytes in various parts of the streambed of the Ostrasyovy Yary tract. As a result of research in 2004–2007. 135 species of invertebrates were identified, including 53 species in the upper reaches, 53 in the middle reaches, and 66 in the lower reaches. Insects dominated, accounting for 68.3% of the collected animals, among which diptera and freckles were the most widespread. The mass species were the mollusks *Pseudeupera arcidens* (Krivosheina, 1978) and the freckles *Nemoura cinerea* Retzius, 1783. For the first time, 3 invertebrate species were indicated for the fauna of the Central Chozem region: the mites *Arrenurus mulleri* Koenike, 1901 and the psychodids (diptera) – *Satchelliella trivialis* (Eaton, 1893) and *Ulomyia cognata* (Eaton, 1893). In the last decade, beaver activity has intensified at the Ostrasyovy Yary site, which has led to significant changes in the spring-stream system. Therefore, the data obtained in the 2004–2007 study can be used as background data for assessing the zoogenic effect on the macrozoobenthos of the spring-stream ecosystem.

**Keywords:** aquatic invertebrates, oligochaetes, leeches, mollusks, ticks, insects.

**For citation:** Silina A.E., Budaeva I.A., Anikeenko E.Yu. 2021. Macrofauna of Invertebrates in Aquatic Ecosystem of Site "Ostrasyevy Yary" of the Belogorye State Nature Reserve According to Data from 2004–2007. Field Biologist Journal, 3 (3): 270–283 (in Russian). DOI: 10.52575/2658-3453-2021-3-3-270-283

Received July 9, 2021

## Введение

Водная экосистема участка «Острасьевы яры» государственного природного заповедника «Белогорье», расположенная в пределах Днепровского бассейна, в начале XXI века представляла собой периодически прерывающуюся родниково-ручьевую систему с выходом ключей (лимнокрен), наличием родниковых топей в верховье ручья (гелокрен) и участков русла шириной до 1 м, чаще – 20–40 см, с выраженным течением (реокрен). Целью нашей работы в 2004–2007 гг. являлось выявление видового состава, доминирующих видов и групп макрозообентоса и зоофитоса в различных участках русла ручья заповедного участка «Острасьевы яры».

В период исследований (2004–2007 гг., сборы А.Е. Силиной и Е.Ю. Аникеенко) гидрофауна этого водотока была представлена преимущественно ручьевыми, родниковыми и полуводными формами, чаще криофильными либо эвритермными видами насекомых (веснянки, поденки, ручейники, двукрылые). В связи с активизацией в последнее десятилетие деятельности бобра водная экосистема урочища Острасьевы яры стала разнородной на различных участках яра. В результате зарегулирования стока ручья при строительстве бобровых плотин водная экосистема к настоящему времени претерпела существенные трансформации в связи с усложнением инфраструктуры бобровых угодий – и в облесенной, и в остепненной частях яра появились бобровые запруды, бобровые каналы, при этом само русло ручья, начиная с верховья, испытывает и биогенную, и гидродинамическую нагрузку, что проявляется в замедлении скорости течения на призапрудных участках, заилении русла и, как следствие, в обеднении и существенной смене экологического облика фаунистических комплексов, населяющих водоток.

Исследования родниковых и ручьевых экосистем европейской части России проводились рядом авторов преимущественно на территории Волжского речного бассейна – в Подмоскowie [Чертопруд, 2006], Пензенской [Ивановский, 2010] и Самарской областях [Чужекова, 2015] и других. На территории Центрально-Черноземного региона (ЦЧР) России родниково-ручьевые экосистемы изучены недостаточно, исследования охватывали в основном бассейн Верхнего Дона [Силина, 2014а; Силина, Иванов, Григоренко, 2004]. Полученные нами данные в исследовании 2004–2007 гг. русла ручья заповедного участка «Остра-

сьевы яры» могут быть использованы в качестве фоновых при оценке зоогенного влияния на макрозообентос родниково-ручьевой экосистемы.

### Объекты и методы исследования

Исследуемая родниково-ручьевая система находится на дне степной балки в урочище Острасьева яры – участок ГПЗ «Белогорье» (Борисовский район, Белгородская область, 50,554472°N, 36,055798°E). Участок был организован в 1995 г., его площадь составляет 90 га. В верховье, в южной части, балка облесена, низовье (северная часть) упирается в искусственную прудовую экосистему на р. Гостинка – притоке р. Ворскла Днепроовского речного бассейна [Решетникова, 2018].

Пробы отбирали гидробиологическим сачком и вручную с камней и погруженных веток 29.09.2004 (сборы А.Е. Силиной), а также 9.11.2005, 30.11.2005, 9.11.2006 и в период с 12.07.2007 по 12.10.2007 (сборы А.Ю. Аникеенко). Пробы промывали в лабораторных условиях. Определение материала велось по специальным ключам [Соколов, 1940; Тузовский 1990; Определитель..., 1994; Определитель..., 1997; Определитель..., 1999; Определитель..., 2001; Определитель..., 2004].

### Результаты исследования

По данным 2004–2007 гг. (17 качественных сборов в 10 пунктах верховья, низовья и среднего течения ручья) население родниково-ручьевой экосистемы «Острасьева ручей» было представлено не менее чем 135 видами беспозвоночных из 4 типов, 8 классов, 16 отрядов и 45 семейств. Из них 116 видов обнаружены в живом виде, другие таксоны идентифицировали по домикам, раковинам либо головным капсулам. Малощетинковые черви (Oligochaeta) были представлены 6 видами, пиявки (Hirudinea) – 5 видами, волосатики (Nematomorpha) – 1 видом, моллюски (Mollusca) – 9 видами (14 с учетом раковин), из них 2 (3) вида двустворчатых (Bivalvia) и 7 (11) видов – брюхоногих (Gastropoda). По одному виду было отмечено в группах ракообразных, пауков и клещей. Наибольшим разнообразием отличались насекомые (Insecta) – 92 вида из 7 отрядов: ногохвостки (Collembola) – 2 вида, веснянки (Plecoptera) – 7 видов, поденки (Ephemeroptera) – 2 вида, ручейники (Trichoptera) – 9 видов, клопы (Heteroptera) – 4 вида, жуки (Coleoptera) – не менее 18 видов, двукрылые (Diptera) – 50 видов. Среди двукрылых на стадиях личинки и куколки выявлено 14 видов короткоусых (Brachycera: семейства Stratiomyidae, Tabanidae, Ephydriidae, Sciomyzidae, Syrphidae, Muscidae), 36 – длинноусых (Nematocera: семейства Ptychopteridae, Limoniidae, Sciaridae, Psychodidae, Dixidae, Culicidae, Simuliidae, Ceratopogonidae и Chironomidae). Наиболее разнообразны представители семейства Chironomidae – 20 видов: Tanypodinae – 8 видов, Prodiamesinae – 1 вид, Orthocladiinae – 2 вида, Chironominae – 9 видов, из них 7 – из трибы Chironomini и 2 – из трибы Tanytarsini.

Численно доминирующей группой среди собранных беспозвоночных были насекомые, составившие 68,3 % от числа собранных животных. Среди них наиболее обильными являлись двукрылые (34,9 %) при доминировании комаров-звонцов (16,5 %), второстепенными – веснянки (21,8 %). Субдоминантной группой по обилию были моллюски (24,7 %) при доминировании двустворчатых из семейства Euglesidae. На долю собранных экземпляров олигохет и пиявок приходится лишь 2,8 и 3,5 % соответственно. Такие группы, как волосатики, ракообразные, пауки и клещи отмечены в сборах единичными экземплярами.

К массовым видам «Острасьева ручья» в период обследования 2004–2007 гг. отнесены мелкие двустворчатые моллюски *Pseudeupera arcidens* (Krivosheina, 1978) (22,1 % от числа собранных беспозвоночных) – вид, характерный для ручьевых и холодноводных малых рек средней полосы, и веснянки *Nemoura cinerea* (Retzius, 1783) (19,0 %) – наиболее эврибионтный представитель отряда, в условиях Центрального Черноземья предпочитающий холодноводные ручьи и верховья малых рек.

Относительно часто встречались земноводные комары – *Dixella serotina* (Meigen, 1818) (5,1 %), реже – моллюски *Planorbis planorbis* (Linnaeus, 1758) (2,5 %), ручейники *Ol-*

*igostomis reticulata* (Linnaeus, 1761) (3,3 %), личинки мух-львинок *Oplodontha viridula* (Fabricius, 1775) (3,0 %), комары-звонцы *Xenopelopia falcigera* (Kieffer, 1911) (3,6 %) и *Microtendipes pedellus* (De Geer, 1776) (2,7 %).

К широко распространенным в пределах ручьевого экосистемы участка «Острасьевы яры» отнесены: тельматофильный вид брюхоногих моллюсков *P. planorbis* (встречался в 66,7 % проб), ручейники *Beraea pullata* (Curtis, 1834) (53,3 % с учетом домиков). В меньшей мере, почти в половине отобранных проб, отмечены львинки *O. viridula*, ручейники *O. reticulata*, комары-звонцы *Conchapelopia melanops* (Wiedemann, 1818) (по 46,7 %), веснянки *N. cinerea* (40,0 %). В трети от общего числа проб отмечены виды малощетинковых червей *Lumbriculus variegatus* (Müller, 1773), пиявки *Glossiphonia heteroclita* (Linnaeus, 1761), моллюски *P. arcidens*, *Lymnaea palustris* (Müller, 1774), двукрылые – *Eleophila submarmorata* (Verrall, 1887), *Satchelliella trivialis* (Eaton, 1893), *Apsectrotanypus trifascipennis* (Zetterstedt, 1835).

В верховье ручья нами было выявлено 53 вида беспозвоночных, при этом наибольшего разнообразия здесь достигают малощетинковые черви, веснянки, жесткокрылые, комары-звонцы из подсемейства Tanypodinae. Доминирование видов и групп в верховье выражено более резко. Доминировали мелкие моллюски *P. arcidens* и веснянки *N. cinerea*. В значимом количестве были выявлены черви *Limnodrilus hoffmeisteri* (Claparede, 1862), пиявки *Helobdella stagnalis* (Linnaeus, 1758), личинки жуков *Yelodes* sp., львинки *O. viridula*, бабочницы *D. serotina*, комары-звонцы *C. melanops*, *Zavrelimyia* sp.

В среднем течении отмечено 55 видов, при этом из Oligochaeta присутствует единственный вид семейства Lumbriculidae, в сравнении с верховьем снизилось разнообразие и доля пиявок при возрастании доли моллюсков, преимущественно брюхоногих. Остается значительной доля жесткокрылых и представителей Tanypodinae из двукрылых. Также среди двукрылых снижается доля и обилие атмосфернодышащих личинок мух-львинок и возрастает доля мух-моллюсковедок (Scyomyzidae), наблюдается рост обилия фиитофильных форм Chironominae. Наиболее многочисленными видами были комары-звонцы *X. falcigera* и *M. pedellus*, менее – брюхоногие *P. planorbis*, веснянки *Leuctra digitata* Kempny, 1899, *N. cinerea*, ручейники *B. pullata*, *O. reticulata*, двукрылые *Tetanocera ferruginea* (Fallen, 1820) и *T. pulchra*. В низовье ручья обнаружено 66 видов беспозвоночных. Здесь в сравнении с участком среднего течения наблюдалось увеличение разнообразия и обилия пиявок и особенно брюхоногих моллюсков, преимущественно представителей семейства Lymnaeidae. Остается высоким разнообразие и обилие ручейников и жуков, наблюдается рост разнообразия личинок мух-львинок, рост обилия земноводных комаров и мокрецов. Семейство Chironomidae представлено преимущественно представителями Tanypodinae. Чаше других здесь встречались виды брюхоногих *L. palustris*, *P. planorbis*, веснянок *N. cinerea*, ручейников *B. pullata*, *O. reticulata*, двукрылых *O. viridula*, *Palpomyia tibialis* (Meigen, 1818), *Zavrelimyia* sp., *C. melanops*, наиболее многочисленным был вид *D. serotina*.

Впервые для фауны Центрального Черноземья отмечены 3 вида беспозвоночных: *Arrenurus mulleri* Koenike, 1901 – палеарктический вид клещей, распространен в Европе, в России известен из ручья на Сахалине [Соколов, 1940], а также из озер, болот, прудов, канав и медленных водотоков в пределах ареала [Тузовский, 1990]; бабочницы (Psychodidae) *Satchelliella trivialis* (Eaton, 1893) – околотовный убиквист, развивается в прибрежном детрите водоемов, в том числе в болотах, и *Ulomyia cognata* (Eaton, 1893) – олигосапробный вид, обычно обитающий в прибрежьях и зонах заплеска родников и ручьев.

В сборах также было выявлено 7 редких видов беспозвоночных. К их числу относятся черви *Rhynchelmis limosella* (Hoffmeister, 1843) – редкий палеарктический вид семейства Lumbriculidae, в ЦЧР отмеченный в болотах Усманского бора в Воронежской области [Силина, Прокин, 2002] и р. Плющань в Липецкой области [Силина, 2014а]. Наибольшее число редких видов выявлено среди ручейников: европейский вид *B. pullata*, ранее в ЦЧР отмеченный в ручье, впадающем в р. Воргол в Липецкой обл. [Силина, Иванов, Григоренко, 2004] и Воловиком ручье в долине р. Айдар в Белгородской области [Силина, 2013,

20146]; *O. reticulata* – редкий европейский вид, в России известный из Коми, Карелии и Ленинградской области, в ЦЧР известен из окрестностей биостанции Воронежского государственного университета «Веневитиново» (Воронежская область) и окрестностей Михайловского горно-обогатительного комбината (Курская область, р. Песочная); транспалеарктический вид *Molannodes tinctus* (Zetterstedt, 1840), основной ареал которого находится в более северных широтах, редок в ЦЧР, где отмечен в окрестностях биостанции «Веневитиново» (Воронежская область) и в р. Ворскла (Белгородская область); а также суператлантический вид *Limnephilus ignavus* (MacLachlan, 1865), известный из Европы и Средней Азии, в ЦЧР отмечен в родниках и ручьях Липецкой и Воронежской областей и в окрестностях п. Борисовка Белгородской области [Силина, Иванов, Григоренко, 2004].

Среди клопов интерес представляет находка крупного панатлантического вида водомерок *Aquarius najas* (De Geer, 1773), отмеченного ранее в ЦЧР в окрестностях п. Борисовка (Белгородская область) [Канюкова, Голуб, Прокин, 2002]. Среди двукрылых к редким отнесен вид бабочниц *Tomoriella pulchra* (Eaton, 1893) с невыясненным ареалом. В ЦЧР вид впервые был обнаружен в Воловиковом ручье долины р. Айдар (Белгородская область) [Силина, 2013, 20146].

Результаты исследования представлены в таблице.

Список водных беспозвоночных ручья в урочище Острасьеви яры  
(Белгородская область, Борисовский район) по данным 2004–2007 гг.  
(2004 г. – сборы А.Е. Силиной, 2005–2007 гг. – сборы Е.Ю. Аникеенко)

The list of aquatic invertebrates of the site Ostrasyevy Yary (Belgorod Region, Borisovsky District)  
according to the data of 2004–2007  
(2004 – collected by A.E. Silina, 2005–2007 – collected by E.Yu. Anikeenko)

Таксоны	Верхнее течение			Среднее течение					Нижнее течение						
	Гелокрен, 29.09.2004	Выход русла, 29.09.2004	Русло, пункт 1, 29.09.2004	Русло, пункт 2 (в 50 м ниже пункта 1), 29.09.2004	Русло у барачных нор, 9.11.2005, 30.11.2005	Рсокрен, 12.07.2007–12.10.2007	Русло, 29.09.2004	Приустьевой участок, 29.09.2004	Расширение русла, 30.11.2005	Устье ручья, 9.11.2006	Мочажина, впадение, 12.07.2007	Гелокрен, 29.09.2004	Выход русла, 29.09.2004	Русло, 30.11.2005	Русло, 29.09.2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Gordiacea</b>															
<i>Gordius</i> sp.															+
<b>Oligochaeta</b>															
<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> (Claparede, 1862)		+													
<i>Limnodrilus profundicola</i> (Verrill, 1873)		+								+					

Продолжение таблицы  
 Continuation of the table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Potamothenis hammoniensis</i> (Michaelson, 1901)		+													
<i>Psammoryctides albicola</i> (Michaelson, 1901)			+												
<i>Rhynchelmis limosella</i> (Hoffmeister, 1843)	+														
<i>Lumbriculus variegatus</i> (Müller, 1773)				+			+	+	+			+			
<b>Hirudinea</b>															
<i>Helobdella stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	+				+								
<i>Glossiphonia heteroclita</i> (Linnaeus, 1761)		+			+						+	+	+		
<i>Glossiphonia complanata</i> (Linnaeus, 1758)		+													
<i>Erpobdella octoculata</i> (Linnaeus, 1758)													+		
<i>Erpobdella lineata</i> (O.F. Müller, 1774)	+	+												+	
<i>Erpobdella</i> sp.															+
<b>Mollusca</b>															
<b>Bivalvia</b>															
<i>Pseudeupera subtruncata</i> (Malm, 1853)				+	+										
<i>Pseudeupera arcidens</i> (Krivosheina, 1978)		+	+				+		+						+
<i>Euglesa</i> sp.															+
<b>Gastropoda</b>															
<i>Lymnaea truncatula</i> (Mueller, 1774)				+				+		+					+
<i>Lymnaea gueretiniana</i> (Servain, 1881)								+				+			
<i>Lymnaea ovata</i> (Draparnaud, 1805)								+							

Продолжение таблицы  
Continuation of the table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Lymnaea palustris</i> (Mueller, 1774)								+		+		+	+		+
<i>Lymnaea turricula</i> (Held, 1836)															
<i>Lymnaea peregra</i> (Mueller, 1774)												+	+		
<i>Lymnaea callomphala</i> (Servain, 1881)												+			
<i>Lymnaea</i> sp.											+				
<i>Armiger crista</i> (Linnaeus, 1758)															+
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)			+	+			+	+	+			+	+	+	+
<i>Anisus laevis</i> (Mueller, 1774)		+													
Crustacea															
? <i>Cyclocypris</i> sp.				+											
Arachnidia															
Aranei															
<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)												+			
Acari															
<i>Arrenurus mulleri</i> Koenike, 1901		+													
Insecta															
Collembola															
<i>Podura aquatica</i> Linnaeus, 1758													+		
<i>Isotomurus palustris</i> (Müller, 1776)				+			+								
Plecoptera															
<i>Leuctra nigra</i> Olivier, 1811			+												
<i>Leuctra hypopus</i> Kempny, 1899			+												
<i>Leuctra digitata</i> Kempny, 1899	-		-	+	+										
<i>Nemurella pictetii</i> Klapalek, 1900			+												
<i>Nemoura cinerea</i> Retzius, 1783	+	+	+	+	+				+						
<i>Nemoura flexuosa</i> Aubert, 1949									+						
<i>Nemoura dubitans</i> Morton, 1894			+												
Ephemeroptera															
<i>Nigrobaetis digitatus</i> (Bengtsson, 1913)												+			

Продолжение таблицы  
 Continuation of the table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Baetis</i> sp.													+		
<b>Trichoptera</b>															
<i>Polycentropus flavomaculatus</i> (Pictet, 1834)	+		+												
<i>Plectrocnemyia conspersa</i> (Curtis, 1834)									+						
<i>Beraea pullata</i> (Curtis, 1834)				+	+		+	+	+			+	+		+
<i>Erotesis</i> sp. (? <i>bal-tica</i> MacLachlan, 1877)													+		
<i>Agrypnia</i> sp.									+						
<i>Oligostomis reticulata</i> (Linnaeus, 1761)	+			+			+	+				+	+		+
<i>Molannodes tinctus</i> (Zetterstedt, 1840)	+		+												
<i>Chaetopteryx</i> sp.												+			
<i>Limnephilus ignavus</i> MacLachlan, 1865							+								+
<b>Heteroptera</b>															
<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758							+								
Gerridae sp.							+								
<i>Aquarius najas</i> (De Geer, 1773)												+			
<i>Hebrus ruficeps</i> (Thomson, 1871)							+								
<b>Coleoptera</b>															
<i>Haliphis sibiricus</i> Motschulsky, 1860												+			
<i>Haliphis</i> sp.								+							
Elmidae sp.		+													
<i>Ylodes</i> sp.	+			+											
<i>Scirtes</i> sp.				+											
Scirtidae sp.								+							
<i>Noterus clavicornis</i> (De Geer, 1774)												+		+	
<i>Platambus</i> sp.		+													
<i>Laccobius minutus</i> (Linnaeus, 1758)												+			
<i>Hydroglyphus geminus</i> (F., 1792)												+			



Продолжение таблицы  
Continuation of the table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Anacaena lutescens</i> (Stephens, 1829)							+					+			
<i>Ilybius fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)												+		+	
<i>Ilybius</i> sp.1				+									+		
<i>Ilybius</i> sp.2								+							
<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)												+			
Dytiscidae sp.			+												
Dytiscidae sp.1			+												
Dytiscidae sp.2			+												
Dytiscidae sp.3			+												
<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)								+							
Hydrophilidae sp.													+		
Diptera															
Brachycera															
Stratiomyidae															
<i>Oplodontha viridula</i> (Fabricius, 1775)	+	+		+				+				+	+	+	
<i>Odonthomyia tigrina</i> (Fabricius, 1775)													+		
<i>Odontomyia angulata</i> (Pancer, [1898])													+		
<i>Stratiomys chamaeleon</i> (L., 1758)												+			
<i>Stratiomys longicornis</i> (Scopoli, 1763)							+						+		
<i>Stratiomys singularior</i> (Harris, [1776])													+		
Tabanidae															
<i>Hybomitra bimaculata</i> (Macquart, 1826)	+														
<i>Crhysops</i> sp.							+								
Syrphidae															
<i>Sericomyia lappona</i> (Linnaeus, 1758)			+												
Ephydriidae															
<i>Parydra</i> sp.	+														
<i>Hydrellia</i> sp.								+				+			

Продолжение таблицы  
 Continuation of the table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sciomyzidae															
<i>Pteromicra agustipennis</i> (Staeger, 1845)												+			
<i>Tetanocera ferruginea</i> Fallen, 1820							+	+				+	+		
Muscidae															
<i>Lispe</i> sp.							+						+		
Nematocera															
Ptychopteridae															
<i>Ptychoptera contaminata</i> (Linnaeus, 1758)		+	+				+								
Limoniidae															
<i>Helius longirostris</i> (Meigen, 1818)					+						+		+	+	
<i>Limnophila schranki</i> Oosterbroek, 1992	+														
<i>Pseudolimnophila lucorum</i> (Meigen, 1818)	+	+							+						
<i>Eleophila submarmorata</i> (Verrall, 1887)	+	+					+		+	+					
Sciaridae															
? <i>Bradisia</i> sp.										+					
Psichodidae															
<i>Satchelliella trivialis</i> (Eaton, 1893)	+		+		+		+					+			
<i>Tonnoriella pulchra</i> (Eaton, 1893)	+	+		+			+								
<i>Ulomyia cognata</i> (Eaton, 1893)	+	+		+											
Dixidae															
<i>Dixa nebulosa</i> (Meigen, 1830)				+											
<i>Dixella serotina</i> (Meigen, 1818)			+					+				+	+		
Culicidae															
<i>Aedes</i> sp.														+	
<i>Anopheles maculipennis</i> (Meigen, 1818)								+							
Simuliidae															
<i>Nevermannia latigonia</i> (Rubzov, 1956)			+												
Ceratopoginidae															
<i>Palpomyia brachyalis</i> (Haliday, 1833) (= <i>P. longipennis</i> (Kieffer, 1919))													+		

Окончание таблицы  
End of the table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Palpomyia tibialis</i> (Meigen, 1818)												+			
Chironomidae															
<i>Apsectrotanypus trifascipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		+	+			+			+				+		
<i>Natarsia punctata</i> (Fabricius, 1805)													+		
<i>Macropelopia</i> sp.	+				+									+	
<i>Conchapelopia melanops</i> (Wiedemann, 1818)	+	+		+	+				+			+	+		
<i>Xenopelopia falcigera</i> (Kieffer, 1911)		+		+				+							
<i>Zavreliomyia</i> sp.			+										+		
<i>Procladius choreus</i> Meigen, 1804		+													
<i>Procladius ferrugineus</i> Kieffer, 1919						+									
<i>Prodiamesa olivacea</i> (Meigen, 1818)						+									
<i>Parametrioctenemus stylatus</i> Kieffer, 1924			+									+			
<i>Chaetocladius</i> sp.			+												
<i>Chironomus uliginosus</i> Kexl, 1960		+	+												
<i>Chironomus</i> sp.						+									
<i>Polypedilum bicrenatum</i> Kieffer, 1921		+													
<i>Polypedilum gr.convictum</i>				+											
<i>Polypedilum scalaenum</i> (Schrank, 1803)					+										
<i>Paratendipes albimanus</i> (Meigen, 1818)	+					+									
<i>Microtendipes pedellus</i> (De Geer, 1776)				+										+	
<i>Tanytarsus excavatus</i> Edwards, 1929										+					
<i>Micropsectra viridiscutellata</i> Goetghebuer, 1931						+									

### Заключение

В результате исследований в ручьево́й экосистеме участка «Острасье́вы яры» выявлено 135 видов беспозвоночных, из них в верховье – 53 вида, в среднем течении – 53, в низовье – 66. Доминировали насекомые, составившие 68,3 % от числа собранных животных, среди которых наиболее массовыми были двукрылые и веснянки. Массовыми видами являлись моллюски *P. arcidens* и веснянки *N. cinerea*. Выявлены широко распространенные и редкие виды.

Впервые для фауны Центрального Черноземья указаны 3 вида беспозвоночных: клещи *A. mulleri* и бабочницы *S. trivialis* и *U. cognata*.

Полученные данные могут быть использованы в качестве фоновых при оценке зоогенного влияния на макрозообентос родниково-ручьево́й экосистемы.

*Авторы выражают глубокую благодарность к.б.н. А.А. Прокину (ИБВВ РАН, Ярославская обл., п. Борок) за проверку определения трудноидентифицируемых видов клопов и жуков. Также авторы признательны за помощь в организации экспедиций дирекции и сотрудникам заповедника «Белогорье».*

### Список литературы

1. Ивановский А.А. 2010. Типы сообществ макрозообентоса в родниках Пензенской области. *Вестник Московского государственного областного университета. Естественные науки*, 3: 72–79.
2. Каниюкова Е.В., Голуб В.Б., Прокин А.А. 2002. Обзор водных полужесткокрылых и водомерок (Heteroptera) фауны среднерусской лесостепи. *Евразийский энтомологический журнал*, 1 (2): 185–196.
3. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. 1994. Т. 1. Низшие беспозвоночные: Губки, Книдарии, Турбеллярии, Коловратки, Гастротрихи, Нематоды, Волосатики, Олигохеты, Пиявки, Мшанки, Тихоходки. СПб., Наука, 396 с.
4. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. 1997. Т. 3. Паукообразные и низшие насекомые: Акариды, Орибатида, Галакариды, Гидрахиды, Пауки, Ногохвостки, Поденки, Веснянки, Стрекозы, Клопы. СПб., Наука, 448 с.
5. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. 1999. Т. 4. Высшие насекомые: Двукрылые насекомые (Комары, Мухи). СПб., Наука, 1000 с.
6. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. 2001. Т. 5. Высшие насекомые: Ручейники, Бабочки, Жуки, Большекрылые, Сетчатокрылые. СПб., Наука, 836 с.
7. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. 2004. Т. 6. Моллюски, Полихеты, Немертины. СПб., Наука, 528 с.
8. Решетникова Н.М. 2018. Примеры влияния бобров на флору хорошо изученных охраняемых территорий. *В кн.: Труды Государственного природного заповедника «Рдейский»*. Т. 4. Бобры в заповедниках европейской части России. Великие Луки, Великолукская типография: 364–382.
9. Силина А.Е. 2013. Амфибиотические насекомые (Insecta) водоемов природного парка «Ровеньский». *В кн.: Гидроэнтомология в России и сопредельных странах. Материалы V Всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым*. ИБВВ им. И.Д. Паланина РАН. Ярославль, Филигрань: 166–178.
10. Силина А.Е. 2014а. Макрозообентос реки Плюшань. *В кн.: Природа Плюшани*. Воронеж, Научная книга: 169–194.
11. Силина А.Е. 2014б. Фауна беспозвоночных родников и ручьев природного парка «Ровеньский» в Белгородской области. *В кн.: Современные проблемы особо охраняемых*

природных территорий регионального значения и пути их решения. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (г. Воронеж, 18 декабря 2014 г.). Воронеж, ВГУ: 232–243.

12. Силина А.Е., Иванов В.Д., Григоренко В.Н. 2004. Список ручейников (Trichoptera) Центрального Черноземья России и сопредельных территорий. В кн.: Фауна, вопросы экологии, морфологии и эволюции амфибиотических и водных насекомых России. Материалы II Всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым (г. Воронеж, 15–17 сентября 2003 г.). Воронеж, ВГУ: 165–196.

13. Силина А.Е., Прокин А.А. 2002. Донная макрофауна болота Клюквенное-1 в Усманском бору. В кн.: Труды лаборатории биоразнообразия и мониторинга наземных и водных экосистем Среднерусской лесостепи: сектор гидробиологического мониторинга. Т. 1. Гидробиологические исследования водоемов Среднерусской лесостепи. Воронеж, ВГУ: 151–220.

14. Соколов И.И. 1940. Фауна СССР. Паукообразные. Т. V. Вып. 2. Hydracarina – Водяные клещи. М.–Л., Наука, 511 с.

15. Тузовский П.В. 1990. Определитель дейтонимф водяных клещей. М., Наука, 238 с.

16. Чертопруд М.В. 2006. Родниковые сообщества макробентоса Московской области. *Журнал общей биологии*, 67 (5): 376–384.

17. Чужекова Т.А. 2015. Межгодовые изменения структуры макрозообентоса родниковых ручьев бассейна Средней Волги в условиях антропогенной нагрузки. *Биология внутренних вод*. 3: 39–48. (Chuzhekova T.A. 2015. Dynamics of macrozoobenthos structure in urban spring brooks of the Middle Volga basin. *Inland Water Biology*, 3: 39–48.)

## References

1. Ivanovskij A.A. 2010. Tipy soobshchestv makrozoobentosa v rodnikah Penzenskoj oblasti [Types of macrozoobenthos communities in the springs of the Penza Region]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Yestestvennyye nauki*, 3: 72–79.

2. Kanyukova E.V., Golub V.B., Prokin A.A. 2002. A Review of Water and Semi-aquatic Bugs (Heteroptera) of the Fauna of the Forest-steppe of European Russia. *Euroasian Entomological journal*, 1 (2): 185–196 (in Russian).

3. Opre delitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy [Keys to freshwater invertebrates of Russia and adjacent territories]. 1994. Vol. 1. Nizshie bespozvonochnye: Gubki, Knidarii, Turbellarii, Kolovratki, Gastrotrikhi, Nematody, Volosatiki, Oligokhety, Piyavki, Mshanki, Tikhokhodki [Lower invertebrates: Sponges, Cnidaria, Turbellaria, Rotifers, Gastrotrichs, Nematodes, Hairworms, Oligochaetes, Leeches, Bryozoans, Tardigrades]. Saint-Petersburg, Publ. Nauka, 396 p.

4. Opre delitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy [Keys to freshwater invertebrates of Russia and adjacent territories]. 1997. Vol. 3. Paukoobraznye i nizshie nasekomye: Akaridy, Oribatidy, Galakaridy, Gidrakhnidy, Pauki, Nogokhvostki, Podenki, Vesnyanki, Strekozv, Klopy [Arachnids and lower insects: Acarids, Oribatids, Galacarids, Hydrachnids, Spiders, Legs, Mayflies, Vesnianski, Dragonflies, Bedbugs]. Saint-Petersburg, Publ. Nauka, 448 p.

5. Opre delitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy [Keys to freshwater invertebrates of Russia and adjacent territories]. 1999. Vol. 4. Vysshie nasekomye: Dvukrylye nasekomye (Komary, Mukhi) [Higher insects: Diptera insects (Mosquitoes, Flies)]. Saint-Petersburg, Publ. Nauka, 1000 p.

6. Opre delitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy [Keys to freshwater invertebrates of Russia and adjacent territories]. 2001. Vol. 5. Vysshie nasekomye: Rucheyniki, Babochki, Zhuki, Bol'shekrylye, Setchatokrylye [Higher insects: Caddis flies, Butterflies, Beetles, Megaloptera, Neuroptera]. Saint-Petersburg, Publ. Nauka, 836 p.

7. Opre delitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy [Keys to freshwater invertebrates of Russia and adjacent territories]. 2004. Vol. 6. Mollyuski, Polikhety, Nemertiny [Molluscs, Polychaetes, Nemertines]. Saint-Petersburg, Publ. Nauka, 528 p.

8. Reshetnikova N.M. 2018. Primery vliyaniya bobrov na floru khorosho izuchennykh okhranyaemykh territoriy [Examples of the influence of beavers on the flora of well-studied protected areas]. In: *Trudy Gosudarstvennogo prirodnogo zapovednika «Rdeyskiy»*. Т. 4. Bobry v zapovednikakh evropeyskoy chasti Rossii. [Proceedings of the State Natural Reserve "Rdeyskiy". Vol. 4. Beavers in the reserves of the European part of Russia]. Velikie Luki, Velikolukskaya tipografiya: 364–382.

9. Silina A.E. 2013. Amphibiotic Insects (Insecta) of Reservoirs of the Rovensky Nature Park. *In: Hydroentomology in Russia and adjacent countries: Materials of the Fifth All-Russia Symposium on Amphibiotic and Aquatic Insects*. Yaroslavl, Publ. Filigran: 166–178 (in Russian).
10. Silina A.E. 2014a. Makrozoobentos reki Plyushchan' [Macrozoobenthos of the Plyushchan river] *In: Priroda Plyushchani [Nature Plyushchan]*. Voronezh, Publ. Nauchnaya kniga: 169–194.
11. Silina A.E. 2014b. Fauna bespozvonochnykh rodnikov i ruch'ev prirodnogo parka «Roven'skiy» v Belgorodskoy oblasti [Fauna of invertebrate springs and streams of the Rovensky Natural Park in the Belgorod Region]. *In: Sovremennye problemy osobo okhranyaemykh prirodnikh territoriy regional'nogo znacheniya i puti ikh resheniya [Modern problems of specially protected natural areas of regional importance and ways to solve them]*. Materials of the Interregional Scientific and Practical Conference (Voronezh, December 18, 2014). Voronezh, Publ. Voronezh State University: 232–243.
12. Silina A.E., Ivanov V.D., Grigorenko V.N. 2004. Spisok rucheynikov (Trichoptera) Tsentral'nogo Chernozem'ya Rossii i sopredel'nykh territoriy [List of caddisflies (Trichoptera) of the Central Black Earth Region of Russia and adjacent territories]. *In: Fauna, voprosy ekologii, morfologii i evolyutsii amfibioteskikh i vodnykh nasekomykh Rossii [Fauna, questions of ecology, morphology and evolution of amphibiotic and aquatic insects in Russia]*. Materials of the II All-Russian Symposium on Amphibiotic and Aquatic Insects (Voronezh, September 15–17, 2003). Voronezh, Publ. Voronezh State University: 165–196.
13. Silina A.E., Prokin A.A. 2002. Donnaya makrofauna bolota Klyukvennoe-1 v Usmanskom boru [Bottom macrofauna of the Klyukvennoye-1 bog in Usmansky pine forest]. *In: Trudy laboratorii bioraznoobraziya i monitoringa nazemnykh i vodnykh ekosistem Srednerusskoy lesostepi: sektor gidrobiologicheskogo monitoringa. T. 1. Gidrobiologicheskiye issledovaniya vodoyemov Srednerusskoy lesostepi [Proceedings of the laboratory of biodiversity and monitoring of terrestrial and aquatic ecosystems of the Central Russian forest-steppe: sector of hydrobiological monitoring. Vol. 1. Hydrobiological studies of reservoirs of the Central Russian forest-steppe]*. Voronezh, Publ. Voronezh State University: 151–220.
14. Sokolov I.I. 1940. Fauna SSSR. Paukoobraznyye. T. V. Vyp. 2. Hydracarina – Vodyanyye kleshchi [Fauna of the USSR. Arachnids. Vol. V. Iss. 2. Hydracarina – Water mites]. Moscow–Leningrad, Publ. Nauka, 511 p.
15. Tuzovskiy P.V. 1990. Opredelitel' deytomif vodyanykh kleshchey [Keys to the deutonymphs of water mites]. Moscow, Publ. Nauka, 238 p.
16. Chertoprud M.V. 2006. Spring macrobenthos communities of the Moscow province. *Zhurnal Obshchei Biologii*, 67 (5): 376–384 (in Russian).
17. Chuzhekova T.A. 2015. Dynamics of macrozoobenthos structure in urban spring brooks of the Middle Volga basin. *Inland Water Biology*, 3: 39–48.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

**Силина Алла Евгеньевна**, старший научный сотрудник государственного природного заповедника «Белогорье», п. Борисовка, Белгородская обл., Россия

**Будаева Ирина Александровна**, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры зоологии и паразитологии медико-биологического факультета Воронежского государственного университета, г. Воронеж, Россия

**Аникеенко Елена Юрьевна**, заместитель директора по просветительской работе государственного природного заповедника «Белогорье», п. Борисовка, Белгородская обл., Россия

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**Alla E. Silina**, Senior Researcher of Belogorye State Nature Reserve, Borisovka vill., Belgorod Region, Russia

**Irina A. Budaeva**, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Zoology and Parasitology of Faculty of Medicine and Biology of Voronezh State University, Voronezh, Russia

**Elena Yu. Anikeenko**, Deputy Director for Educational Activities of Belogorye State Nature Reserve, Borisovka vill., Belgorod Region, Russia