

УРАВНЕНИЯ КИРКВУДА – ЗАЛЬЦБУРГА ДЛЯ РЕШЕТЧАТЫХ КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

Ю. П. Вирченко, Е. Ю. Московченко

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, 308015, Россия

E-mail: virch@bsu.edu.ru

Аннотация. Изучается класс решетчатых моделей статистической механики классических систем с суммируемым парным потенциалом взаимодействия, которые с физической точки зрения описывают т.н. разбавленные системы многих частиц. Получена система уравнений для частных распределений вероятностей, аналогичная системе уравнений Кирквуда – Зальцбурга, которая применяется для исследования непрерывных систем.

Ключевые слова: статистическая механика, распределения Гиббса, решетчатые системы, уравнения Кирквуда-Зальцбурга, статистическая сумма, термодинамический предел, гамильтониан, периодические условия.

Для цитирования: Вирченко Ю. П., Московченко Е. Ю. 2020. Уравнения Кирквуда – Зальцбурга для решетчатых классических моделей статистической механики. Прикладная математика & Физика, 52(2): 62–70. DOI 10.18413/2687-0959-2020-52-2-62-70.

KIRKWOOD – SALZBURG EQUATIONS FOR LATTICE CLASSICAL MODELS OF STATISTICAL MECHANICS

Yu. P. Virchenko, E. Yu. Moskovchenko

Belgorod National Research University,
Belgorod, 308015, Russia

E-mail: virch@bsu.edu.ru

Received February 1, 2020

Abstract. Lattice models of statistical mechanics of classical systems with a summable pair interaction potential, which from the physical point of view describe the so-called diluted systems of many particles are studied. The equations system of partial probabilities is obtained that is similar to the Kirkwood – Salzborg system which is used when continuous models are studied.

Key words: statistical mechanics, Gibbs distributions, lattice systems, Kirkwood – Salzborg equations, partition function, thermodynamic limit, hamiltonian, periodic conditions.

For citation: Virchenko Yu. P., Moskovchenko E. Yu. 2020. Kirkwood – Salzborg’s equations for lattice classical models of statistical mechanics. Applied Mathematics & Physics, 52(2): 62–70 (in Russian).

DOI 10.18413/2687-0959-2020-52-2-62-70.

Введение. Математическим объектом изучения в равновесной статистической механике являются гиббсовские вероятностные меры. Частным случаем таких мер, который изучается в настоящей работе, являются гиббсовские меры, связанные с т. и. решетчатыми моделями, которые являются математическими моделями систем многих частиц, рассматриваемых в физике твердого тела. Для решетчатых моделей меры определяются посредством задания семейства согласованных между собой частных распределений вероятностей $P_\Lambda[\cdot]$ на пространствах элементарных событий $\Omega(\Lambda)$, каждое из которых сопоставляется множеству $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$, $|\Lambda| < \infty$, $d = 1, 2, 3$ (конечной части кристаллической решетки), принадлежащему специальному классу конечных подмножеств из \mathbb{Z}^d . Тогда гиббсовская мера $P[\Sigma]$ случайного события Σ , связанного с фиксированным конечным множеством $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ определяется как совокупность предельных значений последовательности $\langle P_\Lambda[\Sigma]; \Lambda \subset \mathbb{Z}^d \rangle$, $\Sigma \subset \Omega(\Lambda)$, которая соответствует расширяющейся последовательности множеств $\Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^d$. Такие предельные значения вероятностей называются *термодинамически предельными вероятностями*. По поводу используемой терминологии (см., например, [Миплос, 2002], [Gallavotti, 1999]).

Одной из задач статистической механики является задача вычисления предельных значений $P[\Sigma]$ и один из подходов к решению этой задачи связывается с нахождением подходящей системы

уравнений, связывающих предельные значения $P[\Sigma]$ различных случайных событий Σ . В простейшем случае решетчатых моделей, которые соответствуют гиббсовским точечным случайным полям и называются «решеточным газом», такой системой уравнений являются интегральные уравнения, которые применялись для исследования таких моделей в работах [Gallavotti, Miracle-Sole, 1967], [Добрушин, 1968], а также ее видоизменение в работе [Пастур, 1974]. В последнем случае система уравнений апалогична системе уравнений Кирквуда – Зальцбурга [Kirkwood, Salsburg, 1953], используемой при изучении непрерывных моделей статистической механики. Настоящая работа посвящена выводу системы интегральных уравнений, которая представляет собой обобщение систем уравнений, полученных в цитируемых работах, на случай решетчатых систем, которые представляют собой *векторные расслоения* гиббсовских точечных случайных полей. Кроме того, мы распространим положения спектральной теории Л. А. Пастура для полученной памп системы уравнений.

2. Векторные решетчатые модели статистической механики. Определим для каждого множества Λ вероятностного пространства $\langle \mathfrak{S}(\Lambda), P_\Lambda \rangle$ решетчатых систем статистической механики, изучаемых в настоящей работе, где $\mathfrak{S}(\Lambda)$ — пространство состояний системы (пространство элементарных случайных событий) и P_Λ — пормированная мера, заданная в соответствии со структурой измеримости на $\Omega(\Lambda)$.

Прежде всего, опишем класс подмножеств $\Lambda(L) \equiv \Lambda \subset \mathbb{Z}^d$. Определим для любого $L \in \mathbb{N}_+$ множество $\Lambda = \{0, 1, \dots, L\}^d - a_L \langle 1, \dots, 1 \rangle$ с $a_L = L/2$, если L — четное, и $(L-1)/2$, если L — нечетное. При этом для любого L имеет место включение $\Lambda(L+1) \supset \Lambda(L)$ и $\bigcup_{L=0}^{\infty} \Lambda(L) = \mathbb{Z}^d$. Число L будем называть *размером* множества Λ . При этом число точек в множестве Λ с размером L равно $|\Lambda| \equiv (L+1)^d$.

Пространства состояний решетчатых систем статистической механики для каждого из указанных выше множеств Λ представляются в виде прямого произведения

$$\mathfrak{S}(\Lambda) = \bigotimes_{\mathbf{x} \in \Lambda} \mathfrak{S}(\{\mathbf{x}\}). \quad (1)$$

Подразумевается, что на пространстве состояний \mathfrak{S}_Λ имеется структура измеримости и на ней определен интеграл по σ -аддитивной мере. При этом измеримые множества определяются как прямые произведения измеримых множеств в каждом из пространств $\mathfrak{S}(\{\mathbf{x}\})$ состояний с $\mathbf{x} \in \Lambda$, а мера на $\mathfrak{S}(\Lambda)$ определяется как произведение мер $\prod_{\mathbf{x} \in \Lambda} dm_{\mathbf{x}}$, где входящие в это произведение меры $dm_{\mathbf{x}}$, $\mathbf{x} \in \Lambda$ эквивалентны. Тогда гиббсовские распределения вероятностей $P_\Lambda[\Sigma]$ случайных событий $\Sigma \subset \mathfrak{S}(\Lambda)$ для систем статистической механики определяются, для каждого Λ , на основе задания функционала $H_\Lambda[\cdot]$ на пространстве состояний $\mathfrak{S}(\Lambda)$ посредством формулы

$$P_\Lambda[\Sigma] = Q_\Lambda^{-1} \int_{\Sigma} \exp(-H_\Lambda/T) \prod_{\mathbf{x} \in \Lambda} dm_{\mathbf{x}}, \quad (2)$$

$$Q_\Lambda = \int_{\mathfrak{S}_\Lambda} \exp(-H_\Lambda/T) \prod_{\mathbf{x} \in \Lambda} dm_{\mathbf{x}}. \quad (3)$$

Здесь параметр $T > 0$, называемый температурой. Функционал $H_\Lambda[\cdot]$ называется *гамильтонианом* системы.

Для рассматриваемых нами в этой работе *векторных решетчатых моделей* пространство состояний $\mathfrak{S}(\{\mathbf{x}\})$ в каждой точке $\mathbf{x} \in \Lambda$ определяется формулой

$$\mathfrak{S}(\{\mathbf{x}\}) = \{ \langle \rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{x}) \rangle : \rho(\mathbf{x}) \in \{0, 1\}, \mathbf{s}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n, s^2(\mathbf{x}) \leq s^2 \}, \quad (4)$$

$s \in (0, \infty)$, $n \in \mathbb{N}$ так, что все пространство $\mathfrak{S}(\Lambda)$ составляют множество пар $\langle \rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{x}) \rangle$ функций на Λ , из которых $\rho(\mathbf{x})$ — дихотомическая функция со значениями $\{0, 1\}$ и $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ — векторное поле на Λ со значениями в \mathbb{R}^n , $n = 1, 2, 3$. Следовательно, элементами пространства $\mathfrak{S}(\Lambda)$ являются пары $\langle \rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{x}) \rangle$ и гамильтониан $H_\Lambda[\cdot]$ сопоставляет каждой такой паре число из \mathbb{R} . Поэтому его значения мы будем, далее, обозначать посредством $H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]$.

В свою очередь, для векторных моделей измеримые множества в каждом из пространств $\mathfrak{S}(\{\mathbf{x}\})$, $\mathbf{x} \in \Lambda$ определяются измеримыми по Лебегу множествами в \mathbb{R}^n как при значении $\rho(\mathbf{x}) = 0$, так и при значении $\rho(\mathbf{x}) = 1$, а мера $dm[\mathbf{s}(\mathbf{x})]$ на каждом из этих пространств определяется сферически симметричной плотностью $f(s)$, сосредоточенной на $[0, s]$ так, что для фиксированной точки $\mathbf{x} \in \Lambda$ дифференциал меры множества точек пространства $\mathfrak{S}(\{\mathbf{x}\})$ для каждого значения $\rho = \rho(\mathbf{x}) \in \{0, 1\}$, составляющий дифференциальную часть $s^{n-1} ds d\Omega$ сферического слоя около точки $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^n$ с $|\mathbf{s}| = s$, определяемую дифференциалом телесного угла $d\Omega$, равен $w(s) s^{n-1} ds d\Omega \equiv w(s) ds$. Таким образом,

в соответствии с формулами (2), (3), гиббсовское распределение вероятностей для измеримых множеств Σ в пространстве $\mathfrak{S}(\Lambda)$ векторных моделей определяется следующим образом:

$$P_\Lambda[\Sigma] = Q_\Lambda^{-1} \sum_{\substack{\rho(\mathbf{x}) \in \{0,1\}^\Lambda \\ (\rho, \mathbf{s}) \in \Sigma}} \int_{\Sigma_s} \exp\left(-H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]/T\right) \prod_{\mathbf{x} \in \Lambda} w(s(\mathbf{x})) ds(\mathbf{x}), \quad (4)$$

$$Q_\Lambda = \sum_{\rho(\mathbf{x}) \in \{0,1\}^\Lambda} \int_{(\mathbb{R}^n)^{|\Lambda|}} \exp\left(-H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]/T\right) \prod_{\mathbf{x} \in \Lambda} w(s(\mathbf{x})) ds(\mathbf{x}), \quad (5)$$

где $|\mathbf{s}(\mathbf{x})| = s(\mathbf{x})$ и введено обозначение $\Sigma_s = \{(\rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{x})); \mathbf{x} \in \Lambda\} \in \Sigma\}$.

Далее, в этой работе мы будем исследовать векторные модели, гамильтонианы которых содержат только парное взаимодействие между точками $\mathbf{x} \in \Lambda$. Такого рода функционалы определяются формулой

$$H_\Lambda[\rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}] = - \sum_{\mathbf{x} \in \Lambda} \rho(\mathbf{x}) (\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{h}) + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \Lambda^2} U(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \rho(\mathbf{x}) I(\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{y})) \rho(\mathbf{y}). \quad (6)$$

Здесь в первом слагаемом $(\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{h})$ обозначает скалярное произведение вектора $\mathbf{s}(\mathbf{x})$ и постоянно-го вектора \mathbf{h} . Функция $U(\cdot) : \mathbb{Z}^d \mapsto \mathbb{R}$ обладает свойством $U(-\mathbf{x}) = U(\mathbf{x})$, $U(0) = 0$ и является суммируемой $\sum_{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d} |U(\mathbf{x})| < \infty$. Кроме того, функция $I(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)$ является симметричной относительно перестановок аргументов, ограниченной $|I(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)| \leq I$, $\mathbf{s}_j \in \mathbb{R}^n$, $j = 1, 2$ некоторой постоянной $I > 0$. Функция $I(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)$ предполагается зависящей только от инвариантов пары векторов $\langle \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2 \rangle$, то есть от $\mathbf{s}_1^2, \mathbf{s}_2^2$ и скалярного произведения $(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)$.

Для каждого $n = 1 \div |\Lambda|$ и непустого множества $X \subset \Lambda$, $|X| = m$ и связанного с ним набора $(\Sigma_{\mathbf{s}(\mathbf{x}); \mathbf{x} \in X})$ рассмотрим вероятности

$$\begin{aligned} \Pr\{\tilde{\rho}(\mathbf{x}) = 1 \vee \tilde{\mathbf{s}}(\mathbf{x}) \in \Sigma_{\mathbf{s}(\mathbf{x}); \mathbf{x} \in X}\} &= Q_\Lambda^{-1} \sum_{\rho \in \{0,1\}^\Lambda} \left(\prod_{\mathbf{x} \in X} \rho(\mathbf{x}) \right) \times \\ &\times \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{x}) \in \Sigma_{\mathbf{s}(\mathbf{x}); \\ \mathbf{x} \in X}} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n; \\ \mathbf{x} \in \Lambda \setminus X}} \exp\left(-H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]/T\right) \prod_{\mathbf{y} \in \Lambda} w(s(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}). \end{aligned}$$

Здесь знаком «тильда» помечены случайные величины.

Введем плотности $f_m(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X)$ распределения этих вероятностей, которые выражаются производными по мере $\prod_{\mathbf{x} \in X} ds(\mathbf{x})$ множества Σ_s ,

$$\begin{aligned} f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X) &= Q_\Lambda^{-1} \sum_{\rho \in \{0,1\}^\Lambda} \left(\prod_{\mathbf{x} \in X} \rho(\mathbf{x}) w(s(\mathbf{x})) \right) \times \\ &\times \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n; \\ \mathbf{y} \in \Lambda \setminus X}} \exp\left(-H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]/T\right) \prod_{\mathbf{y} \in \Lambda \setminus X} w(s(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}). \end{aligned} \quad (7)$$

Тогда каждая из вероятностей $p(X) = \Pr\{\tilde{\rho}(\mathbf{x}) = 1; \mathbf{x} \in X\}$, $\emptyset \neq X \subset \Lambda$ определяется формулой

$$\begin{aligned} p(X) &= \sum_{\rho \in \{0,1\}^\Lambda} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n; \\ \mathbf{y} \in X}} f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X) \prod_{\mathbf{y} \in X} w(s(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}) = \\ &= Q_\Lambda^{-1} \sum_{\rho \in \{0,1\}^\Lambda} \left(\prod_{\mathbf{x} \in X} \rho(\mathbf{x}) w(s(\mathbf{x})) \right) \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n; \\ \mathbf{y} \in \Lambda \setminus X}} \exp\left(-H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]/T\right) \prod_{\mathbf{y} \in \Lambda \setminus X} w(s(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}). \end{aligned}$$

Формулу (7) можно записать в иной форме, более удобной для решения той задачи, которой посвящена настоящая работа. Сопоставим каждой функции $\rho(\mathbf{x})$, множество $Z = \{\mathbf{z} \in \Lambda : \rho(\mathbf{z}) = 1\}$, в терминах которого запишем формулу (6) для гамильтониана системы

$$H_\Lambda[\rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}] \equiv H_\Lambda(Z; \mathbf{s}) = - \sum_{\mathbf{z} \in Z} (\mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{h}) + \frac{1}{2} \sum_{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \in Z} U(\mathbf{x} - \mathbf{y}) I(\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{y})). \quad (8)$$

Плотность $f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X)$ в терминах такой функции $H(Z)$, $Z \subset \Lambda$ записывается в виде

$$f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X) = Q_\Lambda^{-1} \left(\prod_{\mathbf{x} \in X} w(s(\mathbf{x})) \right) \times \sum_{Y \subset \Lambda \setminus X} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \Sigma_{\mathbf{x}}; \\ \mathbf{y} \in Y}} \exp \left(-H_\Lambda(X \cup Y; \mathbf{s})/T \right) \prod_{\mathbf{y} \in Y} w(s(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}), \quad (9)$$

$$Q_\Lambda = \sum_{X \subset \Lambda} \int_{\mathbf{s}(\mathbf{x}); \mathbf{x} \in X} \exp \left(-H_\Lambda(X; \mathbf{s})/T \right) \prod_{\mathbf{x} \in X} w(s(\mathbf{x})) ds(\mathbf{x}). \quad (10)$$

3. Периодические условия. В статистической механике часто применяется аппроксимация, основанная на замене гамильтониана H_Λ гамильтонианом \hat{H}_Λ , получаемом в результате отождествления противоположных граней параллелепипеда Λ , на котором определено пространство $\mathfrak{S}(\Lambda)$ состояний модели. Получаемая при этом модель называется моделью с периодическими граничными условиями, соответствующей исходной решеточной модели (см. [Минлос, 2002]). Использование модели с периодическими граничными условиями упрощает всевозможные конструкции в рамках статистической механики, связанные с вычислениями статистических и термодинамических характеристик модели и доказательства утверждений о ее качественных свойствах.

Обычно, понятие системы с периодическими граничными условиями вводится в том случае, когда взаимодействие обладает конечным радиусом [Минлос, 2002]. Однако при оценке энергии конкретного состояния, в частности, при решении задачи об определении основного состояния конечной системы статистической механики, совсем не очевидно, что аппроксимация исходного гамильтониана $H_\Lambda[\cdot]$ системы, который физически не обладает конечным радиусом действия, каким-либо гамильтонианом конечного радиуса действия, приводит к близости вычисляемых величин.

В этом разделе мы вводим для каждой модели, определяемой гамильтонианом (6), понятие аппроксимирующей ее модели с периодическими граничными условиями в том случае, когда потенциал U не обладает конечным радиусом действия, и находим оценку близости энергий исходной и аппроксимирующей моделей для каждого состояния из $\mathfrak{S}(\Lambda)$.

Зафиксируем множество Λ и на его основе определим для каждой точки $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d$ действие оператора P_Λ проектирования. Точка $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d$ однозначно представима в виде $\mathbf{x} = (L+1) \sum_{j=1}^d n_j \mathbf{e}_j + \mathbf{y}$, $\mathbf{y} \in \Lambda$, \mathbf{e}_j – орты в \mathbb{R}^d , $(\mathbf{e}_j)_i = \delta_{ij}$, $n_j \in \mathbb{Z}$, $i, j = 1 \div d$. Положим, по определению, $P_\Lambda \mathbf{x} = \mathbf{y}$.

Определение. Гамильтониан

$$\hat{H}_\Lambda[\rho, \mathbf{s}] = - \sum_{\mathbf{x} \in \Lambda} \rho(\mathbf{x})(s(\mathbf{x}), \mathbf{h}) + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\mathbf{x} \in \Lambda, \\ \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^d, \mathbf{y} \neq \mathbf{x}}} U(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \rho(\mathbf{x}) I(\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(P_\Lambda \mathbf{y})) \rho(P_\Lambda \mathbf{y}) \quad (11)$$

назовем гамильтонианом с периодическими граничными условиями, аппроксимирующим гамильтониан $H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]$.

Сопоставив каждой функции $\rho(\mathbf{x})$ множество $Z = \{\mathbf{x} \in \Lambda : \rho(\mathbf{x}) = 1\}$, формулу (11), определяющую гамильтониан с периодическими условиями, запишем в виде

$$\hat{H}_\Lambda(Z; \mathbf{s}) = - \sum_{\mathbf{x} \in X} (s(\mathbf{x}), \mathbf{h}) + \frac{1}{2} \sum_{\substack{\mathbf{x} \in Z, \\ \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^d: \mathbf{x} \neq P_\Lambda \mathbf{y} \in Z}} U(\mathbf{x} - \mathbf{y}) I(\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(P_\Lambda \mathbf{y})). \quad (12)$$

Нормой $\|\cdot\|_0$ гамильтониана \hat{H}_Λ называется число

$$\|H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]\|_0 = \max\{|\Lambda|^{-1} |H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]| : \langle \rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{x}); \mathbf{x} \in \Lambda \rangle \in \mathfrak{S}(\Lambda), \Lambda \subset \mathbb{Z}^d\}. \quad (13)$$

В случае гамильтониана с конечным радиусом действия, очевидно, что разность между энергиями $H_\Lambda[\mathbf{s}]$ и $\hat{H}_\Lambda[\mathbf{s}]$ должна быть пропорциональна площади поверхности кристалла, то есть L^{d-1} при $L \rightarrow \infty$. Если же взаимодействие является дальнедействующим, то такая оценка может быть слабее.

Для получения оценок близости по норме $\|\cdot\|_0$ гамильтонианов $H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]$ и $\hat{H}_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]$ установим предварительно следующую простую геометрическую оценку

Лемма. Для любой точки $\mathbf{z} \in \mathbb{Z}^d$ имеет место следующее неравенство

$$|\Lambda \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \Lambda + \mathbf{z})| \leq dL^{d-1} \max\{|z_j|; j = 1, \dots, d\} \equiv dL^{d-1} \|\mathbf{z}\| \quad (14)$$

и при $\|\mathbf{z}\| > L\sqrt{d} + 1$ выполняется $|\Lambda \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \Lambda + \mathbf{z})| = 0$.

□ Любая точка $\mathbf{x} \in \Lambda$ после сдвига вдоль одной из осей на величину L приведет к тому, что она либо выйдет за пределы Λ , либо перейдет в граничную точку Λ . Тогда сдвиг на любой вектор $\mathbf{z} = L \sum_{j=1}^d \theta_j \mathbf{e}_j$, $\theta_j \in \{0, 1\}$ приведет к тому, что она выйдет за пределы Λ , либо попадет в угловую точку Λ . Длина вектора \mathbf{z} в этом случае не превосходит $L\sqrt{d}$. Тогда точка \mathbf{x} , наверняка, выйдет за пределы Λ , если $|\mathbf{z}| > L\sqrt{d}$. Ввиду того, что точка $\mathbf{x} \in \Lambda$ выбрана произвольно, то $\Lambda \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \Lambda + \mathbf{z}) = \emptyset$, если $|\mathbf{z}| \geq L\sqrt{d} + 1$. Отсюда следует последнее равенство в формулировке леммы.

Доказательство неравенства (14) проведем индукцией по d . При $d = 1$ и $|\mathbf{z}| \leq L$ имеем точное равенство, так как $\Lambda = \{0, 1, \dots, L\}$ и $\Lambda + \mathbf{z} = \{z, z+1, \dots, z+L\}$. Тогда $|\Lambda \cap (\mathbb{Z} \setminus \Lambda + \mathbf{z})| = L - (L - |\mathbf{z}|) = |\mathbf{z}|$.

Пусть неравенство (14) имеет место для значения d . Тогда, так как, в общем случае,

$$|\Lambda \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \Lambda + \mathbf{z})| = (L + 1)^d - \prod_{j=1}^d (L + 1 - |z_j|),$$

то для значения $(d + 1)$ и любой точки $\mathbf{z} = \langle z_1, \dots, z_d, z_{d+1} \rangle$, имеем, согласно предположению индукции,

$$\begin{aligned} |\Lambda \cap (\mathbb{Z}^{d+1} \setminus \Lambda + \mathbf{z})| &= (L + 1)^{d+1} - \prod_{j=1}^{d+1} (L + 1 - |z_j|) = \\ &= (L + 1) \left((L + 1)^d - \prod_{j=1}^d (L + 1 - |z_j|) \right) + \left((L + 1) \prod_{j=1}^d (L + 1 - |z_j|) - \prod_{j=1}^{d+1} (L + 1 - |z_j|) \right) \leq \\ &\leq dL^d \max\{|z_j|; j = 1, \dots, d\} + \left(\prod_{j=1}^d (L + 1 - |z_j|) \right) (L + 1 - (L + 1 - |z_{d+1}|)) \leq \\ &\leq d(L + 1)^d \max\{|z_j|; j = 1, \dots, d\} + (L + 1)^d |z_{d+1}| \leq (d + 1)(L + 1)^d \max\{|z_j|; j = 1, \dots, d + 1\}. \blacksquare \end{aligned}$$

Из полученной геометрической оценки следует оценка близости энергий произвольного состояния $\langle \rho(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{x}) \rangle$, $\mathbf{x} \in \Lambda$, вычисленных на основе гамильтонианов H_Λ и \tilde{H}_Λ .

Теорема. *Имеет место следующее неравенство:*

$$\|H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}] - \tilde{H}_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]\|_0 \leq \frac{dI}{2(L + 1)} \sum_{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d : \mathbf{z} \neq 0} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\|. \quad (15)$$

□ Очевидны следующие неравенства:

$$\begin{aligned} |H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}] - \hat{H}_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]| &\leq \frac{1}{2} \sum_{\substack{\mathbf{x} \in \Lambda, \\ \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^d \setminus \Lambda}} |U(\mathbf{x} - \mathbf{y})| \left| I(\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{P}_\Lambda \mathbf{y})) \right| \leq \\ &\leq \frac{I}{2} \sum_{\substack{\mathbf{x} \in \Lambda, \\ \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^d \setminus \Lambda}} |U(\mathbf{x} - \mathbf{y})| = \frac{I}{2} \sum_{z \in \mathbb{Z}^d : \mathbf{z} \neq 0} |U(\mathbf{z})| |\Gamma(\mathbf{z}; \Lambda)|, \end{aligned} \quad (16)$$

где $\Gamma(\mathbf{z}; \Lambda) = \{ \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle : \mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{z}, \mathbf{x} \in \Lambda, \mathbf{y} \notin \Lambda \}$.

Каждая пара, принадлежащая $\Gamma(\mathbf{z}, \Lambda)$, взаимно однозначным образом определяется точкой $\mathbf{x} \in \Lambda$ так, что $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{z} \notin \Lambda$. При этом $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{z} \in \mathbb{Z}^d \setminus \Lambda + \mathbf{z}$. Следовательно,

$$\{ \mathbf{x} : \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \in \Gamma(\mathbf{z}, \Lambda) \} \subset \{ \mathbf{x} : \mathbf{x} \in \Lambda, \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d \setminus \Lambda + \mathbf{z} \} = \Lambda \cap (\mathbb{Z}^d \setminus \Lambda + \mathbf{z}).$$

Тогда $|\Gamma(\mathbf{z}, \Lambda)| \leq |\Lambda \cap ((\mathbb{Z}^d \setminus \Lambda) + \mathbf{z})|$. Поэтому, применив оценку (14), получаем (15). ■

Из полученной оценки (15) разности энергий следует, что для далекодействующих взаимодействий с конечной нормой $\|\cdot\|_0$, для которых

$$\sum_{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d} |U(\mathbf{x})| \|\mathbf{x}\| = \infty,$$

разность (15) возрастает быстрее, чем площадь поверхности Λ . Это затрудняет использование аппроксимации исходной системы соответствующей ей системой с периодическими граничными условиями в случае далекодействующих потенциалов взаимодействия. Этот факт был отмечен в работах [Клюев, Вирченко 2015], [Вирченко, 1991]. Тем не менее, справедливо

Следствие. Если $H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]$ имеет конечную норму, то при термодинамическом предельном переходе имеет место

$$\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{|\Lambda|} |H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}] - \hat{H}_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]| = 0. \quad (17)$$

□ Так как $\|H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]\|_0 < \infty$, то $\sum_{\mathbf{z} \in \mathbb{Z}^d} |U(\mathbf{z})| < \infty$. Для функций $U(\cdot)$ такого типа имеет место

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \sum_{\mathbf{z} \in \Lambda} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\| = 0.$$

В самом деле, выберем произвольное число $\varepsilon > 0$ и найдем такой размер L_ε , для которого

$$\sum_{\mathbf{z}: \|\mathbf{z}\| > L_\varepsilon} |U(\mathbf{z})| < \varepsilon.$$

Тогда при $L > L_\varepsilon$ справедлива оценка

$$\sum_{\mathbf{z} \in \Lambda} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\| = \sum_{\mathbf{z} \in \Lambda: \|\mathbf{z}\| > L_\varepsilon} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\| + \sum_{\mathbf{z} \in \Lambda: \|\mathbf{z}\| \leq L_\varepsilon} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\|.$$

Для оценки первой суммы используем неравенство $\|\mathbf{z}\| < L$ при фиксированном L_ε ,

$$\sum_{\mathbf{z} \in \Lambda} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\| < \varepsilon L + \sum_{\mathbf{z} \in \Lambda: \|\mathbf{z}\| \leq L_\varepsilon} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\|.$$

Подставим эту оценку в (15), где учтем, что при $\|\mathbf{z}\| > L\sqrt{d} + 1$, $\Lambda \cap ((\mathbb{Z}^d \setminus \Lambda) + \mathbf{z}) = \emptyset$,

$$\begin{aligned} |H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}] - \hat{H}_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]| &< \frac{1}{2} d(L+1)^{d-1} I \sum_{\substack{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d: \mathbf{z} \neq 0 \\ \|\mathbf{z}\| \leq L\sqrt{d}+1}} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\| < \\ &< \frac{1}{2} dL^d I \varepsilon + \frac{1}{2} d(L+1)^{d-1} I \sum_{\substack{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^d: \mathbf{z} \neq 0, \|\mathbf{z}\| \leq L_\varepsilon \\ \|\mathbf{z}\| \leq L\sqrt{d}+1}} |U(\mathbf{z})| \|\mathbf{z}\|, \end{aligned}$$

так как $L\sqrt{d} + 1 > L_\varepsilon$. Поделим обе части неравенства на $|\Lambda| = L^d$ и перейдем к пределу $L \rightarrow \infty$. В результате, так как второе слагаемое в правой части стремится к нулю при фиксированной величине L_ε , то мы получим, что

$$\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} \frac{1}{|\Lambda|} |H_\Lambda[\rho, \mathbf{s}] - \hat{H}_\Lambda[\rho, \mathbf{s}]| \leq \varepsilon.$$

Ввиду произвольности величины $\varepsilon > 0$, получаем (17). ■

4. Интегральные уравнения для плотностей f_m . Выведем систему уравнений для плотностей $f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X)$ модели решеточного газа с парным потенциалом U , аналогичную системе, введенной в работе [Пастур, 1974], при изучении модели решеточного газа. При ее выводе используется схема рассуждений, аналогичная той (см. [Рюэль, 1971]), которая используется для анализа многочастичных конфигурационных функций в статистической механике непрерывных систем.

Пусть $X = \{\mathbf{x} : \rho(\mathbf{x}) = 1\} \subset \Lambda$. Воспользовавшись формулой (12), запишем выражение (7) для плотностей $f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X)$ в следующем виде:

$$\begin{aligned} f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X) &= Q_\Lambda^{-1} \sum_{Y \subset \Lambda \setminus X} \left(\prod_{\mathbf{x} \in X} w(\mathbf{s}(\mathbf{x})) \right) \times \\ &\times \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{y} \in Y}} \exp\left(-H_\Lambda(X \cup Y; \mathbf{s})/T\right) \prod_{\mathbf{y} \in Y} w(\mathbf{s}(\mathbf{y})) d\mathbf{s}(\mathbf{y}). \end{aligned} \quad (18)$$

Введем в рассмотрение функцию $K(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2; \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) = \exp(-U(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)I(\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)/T) - 1$, определенную для любых $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{Z}^d$, $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2 \in \mathbb{R}^n$, а также следующую функцию на $\mathbb{Z}^d \times \mathfrak{P}(\mathbb{Z}^d)$, где $\mathfrak{P}(\mathbb{Z}^d)$ – семейство всех конечных подмножеств \mathbb{Z}^d :

$$W_\Lambda(\mathbf{x}; X; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X) = \exp\left([\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{h}] - \sum_{\substack{\mathbf{x} \in X, \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^d: \\ \mathbf{x} \neq \mathbf{P}_\Lambda \mathbf{y} \in X}} U(\mathbf{x} - \mathbf{y})I(\mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{P}_\Lambda \mathbf{y}))\right]/T,$$

$W_\Lambda(\mathbf{x}; \emptyset) = 1$. Тогда для любых $X \subset \Lambda \setminus \{\mathbf{x}\}$, $Y \subset \Lambda \setminus \{\mathbf{x}\}$, $X \cap Y = \emptyset$ имеет место

$$\begin{aligned} \exp(-H_\Lambda(\{\mathbf{x}\} \cup X \cup Y; \mathbf{s})/T) &= \\ &= W_\Lambda(\mathbf{x}; X; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X) W_\Lambda(\mathbf{x}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) \exp(-H_\Lambda(X \cup Y; \mathbf{s})/T) = \\ &= W_\Lambda(\mathbf{x}; X; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X) \prod_{\mathbf{y} \in Y} (1 + K(\mathbf{x} - \mathbf{y}; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{y}))) \exp(-H_\Lambda(X \cup Y; \mathbf{s})/T). \end{aligned} \quad (19)$$

Это равенство сохраняется и при $|X \cup Y| = 1$, так как в этом случае $H_\Lambda(X \cup Y; \mathbf{s}) = \exp(\langle \mathbf{h}, \mathbf{s}(\mathbf{z}) \rangle)$, где $\mathbf{z} = \mathbf{x}, \mathbf{y}$, в зависимости от того, какое из множеств пусто.

Определим, далее, функцию

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) = \left\{ \prod_{\mathbf{y} \in Y} K(\mathbf{x} - \mathbf{y}; \mathbf{s}, \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y), \text{ при } |Y| > 0; 1, \text{ при } |Y| = 0. \right\}$$

такую, что

$$\prod_{\mathbf{y} \in Z} (1 + K(\mathbf{x} - \mathbf{y}; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{y}))) = \sum_{Y \subset Z} \prod_{\mathbf{y} \in Y} K(\mathbf{x} - \mathbf{y}; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{s}(\mathbf{y})) = \sum_{Y \subset Z} K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y). \quad (20)$$

Наконец, введем в рассмотрение пространство \mathfrak{E}_Λ всех наборов $\mathbf{f}^\Lambda = \langle f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X) : \emptyset \neq X \subset \Lambda \rangle$ функций с $\mathbf{s}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in \Lambda$.

Подставим (19), вместе с (20), в выражение для $f_{m+1}^{(\Lambda)}(X \cup \{\mathbf{x}\}; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X \cup \{\mathbf{x}\})$ с $X \subset \Lambda \setminus \{\mathbf{x}\}$, получаемое на основе (18):

$$\begin{aligned} f_{m+1}^{(\Lambda)}(X \cup \{\mathbf{x}\}; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X \cup \{\mathbf{x}\}) &= w(\mathbf{s}(\mathbf{x})) W_\Lambda(\mathbf{x}; X; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X) \times \\ &\times Q_\Lambda^{-1} \sum_{Y \subset \Lambda \setminus X \cup \{\mathbf{x}\}} \sum_{\substack{Z: Y \subset Z, \\ Z \subset \Lambda \setminus X \cup \{\mathbf{x}\}}} \left(\prod_{\mathbf{y} \in X} w(\mathbf{s}(\mathbf{y})) \right) \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{y} \in Y}} K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) \times \\ &\times \exp(-H_\Lambda(X \cup Y; \mathbf{s})/T) \prod_{\mathbf{y} \in Y} w(\mathbf{s}(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}) \end{aligned} \quad (21)$$

и произведем следующие преобразования суммы:

$$\begin{aligned} &Q_\Lambda^{-1} \sum_{Y \subset \Lambda \setminus X \cup \{\mathbf{x}\}} \sum_{\substack{Z: Y \subset Z, \\ Z \subset \Lambda \setminus X \cup \{\mathbf{x}\}}} \left(\prod_{\mathbf{y} \in X} w(\mathbf{s}(\mathbf{y})) \right) \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{y} \in Y}} K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) \times \\ &\times \exp(-H_\Lambda(X \cup Y; \mathbf{s})/T) \prod_{\mathbf{y} \in Y} w(\mathbf{s}(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}) = \\ &= \sum_{Y \subset \Lambda \setminus X \cup \{\mathbf{x}\}} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{y} \in Y}} K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) \prod_{\mathbf{y} \in X \cup Y} w(\mathbf{s}(\mathbf{y})) ds(\mathbf{y}) \times \\ &\times Q_\Lambda^{-1} \sum_{Z \subset \Lambda \setminus (X \cup Y \cup \{\mathbf{x}\})} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{z}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{z} \in \Lambda \setminus Z}} \exp(-H_\Lambda(X \cup Y \cup Z; \mathbf{s})/T) \prod_{\mathbf{z} \in Z} w(\mathbf{s}(\mathbf{z})) ds(\mathbf{z}) = \\ &= \sum_{Y \subset \Lambda \setminus (X \cup \{\mathbf{x}\})} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{y} \in Y}} K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) \times \\ &\times [f_{m+|Y|}^{(\Lambda)}(X \cup Y; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup Y) - f_{m+1+|Y|}^{(\Lambda)}(\{\mathbf{x}\} \cup X \cup Y; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup Y \cup \{\mathbf{x}\})] \prod_{\mathbf{y} \in Y} ds(\mathbf{y}), \end{aligned}$$

так как $\sum_{Z \subset \Lambda \setminus (\{\mathbf{x}\} \cup X \cup Y)} (\cdot) = \sum_{Z \subset \Lambda \setminus (X \cup Y)} (\cdot) - \sum_{\mathbf{x} \in Z \subset \Lambda \setminus (X \cup Y)} (\cdot)$. Подставим полученное выражение в (21). Выделив слагаемые с $Y = \emptyset$, получаем систему линейных алгебраических тождеств набора плотностей распределения вероятностей $f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in X)$ с $\mathbf{s}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{x} \in X$, $\emptyset \neq X \subset \Lambda$:

$$f_{m+1}^{(\Lambda)}(X \cup \{\mathbf{x}\}; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X \cup \{\mathbf{x}\}) = w(\mathbf{s}(\mathbf{x})) W_\Lambda(\mathbf{x}; X; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X) \times$$

$$\begin{aligned}
& \times \left[f_m^{(\Lambda)}(X; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X) - f_{m+1}^{(\Lambda)}(\{\mathbf{x}\} \cup X; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup \{\mathbf{x}\}) + \right. \\
& + \sum_{Y \subset \Lambda \setminus (X \cup \{\mathbf{x}\})} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{y} \in Y}} K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) \times \\
& \left. \times \left[f_{m+|Y|}^{(\Lambda)}(X \cup Y; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup Y) - f_{m+1+|Y|}^{(\Lambda)}(\{\mathbf{x}\} \cup X \cup Y; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup Y \cup \{\mathbf{x}\}) \right] \prod_{\mathbf{y} \in Y} ds(\mathbf{y}) \right]. \quad (22)
\end{aligned}$$

Таким образом, нами получена система интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода, которой подчинен набор плотностей распределения для векторных решетчатых моделей.

Можно показать, что эту систему можно рассматривать в пространстве \mathfrak{E}_Λ . В связи с этим, ее вид не зависит от выбора точки \mathbf{x} в каждом из множеств $X \cup \{\mathbf{x}\} \subset \Lambda$. Поэтому ее выбор можно унифицировать. Будем полагать, что в каждом $X \subset \Lambda$ эта точка выбирается первой в смысле лексикографического порядка на решетке \mathbb{Z}^d .

Наконец, укажем, что предельные плотности $f_m(X; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X)$, $m \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq X \subset \mathbb{Z}^d$, получаемые при термодинамическом предельном переходе $\Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^d$, должны удовлетворять следующей предельной системе интегральных уравнений:

$$\begin{aligned}
& f_{m+1}(X \cup \{\mathbf{x}\}; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X \cup \{\mathbf{x}\}) = w(\mathbf{s}(\mathbf{x}))W(\mathbf{x}; X; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in X) \times \\
& \times \left[f_m(X; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X) - f_{m+1}(\{\mathbf{x}\} \cup X; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup \{\mathbf{x}\}) + \right. \\
& + \sum_{Y \subset \mathbb{Z}^d \setminus (X \cup \{\mathbf{x}\})} \int_{\substack{\mathbf{s}(\mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n: \\ \mathbf{y} \in Y}} K(\mathbf{x}, \mathbf{s}; Y; \mathbf{s}(\mathbf{y}), \mathbf{y} \in Y) \times \\
& \left. \times \left[f_{m+|Y|}(X \cup Y; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup Y) - f_{m+1+|Y|}(\{\mathbf{x}\} \cup X \cup Y; \mathbf{s}(\mathbf{z}), \mathbf{z} \in X \cup Y \cup \{\mathbf{x}\}) \right] \prod_{\mathbf{y} \in Y} ds(\mathbf{y}) \right]. \quad (23)
\end{aligned}$$

Эта система может рассматриваться как видоизменение, но отношению к классическим векторным решетчатым моделям, известной системы интегральных уравнений Кирквуда – Зальцбурга [Kirkwood, Salsburg, 1953] в статистической механике непрерывных моделей.

Список литературы

1. Ахиезер А. И., Барьяхтар В. Г., Пелетминский С. В. 1967. Спиновые волны. М., Наука, 368.
2. Вирченко Ю. Н. 1991. К теории основного состояния обменной модели Гейзенберга. Проблемы теоретической физики. Киев: Наукова думка, 80–96.
3. Добрушин Р. Л. 1968. Гиббсовские случайные поля для решетчатых систем с попарным взаимодействием. Функциональный анализ и его приложения, 4(1): 31–43.
4. Клюев А. С., Вирченко Ю. Н. 2015. Оценка энергии векторной решеточной модели с периодическими граничными условиями. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика. Физика, 11(208)(39): 121–125.
5. Минлос Р. А. 1968. Лекции по статистической физике. Успехи мат. наук, 1: 133–190.
6. Минлос Р. А. 2002. Введение в математическую статистическую физику. М., МЦНМО, 111.
7. Настур Л. А. 1974. Спектральная теория уравнений Кирквуда – Зальцбурга в конечном объеме. Теорет. и матем. физика, 18(2): 233–242.
8. Рюэль Д. 1971. Статистическая механика. Строгие результаты. М., Мир, 367.
9. Gallavotti G., Miracle-Sole S. 1967. Statistical Mechanics of Lattice Systems. Commun. Math. Phys, 5: 317–323.
10. Gallavotti G. Statistical mechanics. 1999. Roma: Dipartimento di Fisica Università di Roma, 349.
11. de Lacheisserie E., Gignoux D., Schlenker M. 2005. Magnetism: Fundamentals. Springer, 1: 315–317.
12. Kirkwood J. G., Salsburg Z. 1953. W. The statistical mechanical theory of molecular distribution functions in liquids. Discussion of the Faraday Society, 15(1): 28–34.

13. Stohr J., Siegmann H. C. 2006. Magnetism: From Fundamentals to Nanoscale Dynamics. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 290–293.

References

1. Akhiezer A. I., Baryakhtar V. G., Peletminsky S. V. 1967. Spinovye volny [Spin waves]. M., Nauka, 368.
2. Virchenko Yu. P. 1991. K teorii osnovnogo sostoyaniya obmennoj modeli Gejzenberga [On the theory of the ground state of the Heisenberg exchange model]. Problemy teoreticheskoy fiziki. Kiev: Naukova dumka, 80–96.
3. Dobrushin R. L. 1968. Gibbsovskie sluchajnye polya dlya reshetchatykh sistem s poparnym vzaimodejstviem [Gibbs random fields for lattice systems with pairwise interaction]. Funkcional'nyj analiz i ego prilozheniya, 4(1): 31–43.
4. Klyuev A. S., Virchenko Yu. P. 2015. Ocenka energii vektornoj reshetочноj modeli s periodicheskimi granichnymi usloviyami [Energy estimation of a vector lattice model with periodic boundary conditions]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Matematika. Fizika, 11(208)(39): 121–125.
5. Minlos R. A. 1968. Lekcii po statisticheskoy fizike [Lectures on statistical physics]. Uspekhi mat. nauk, 1: 33–190.
6. Minlos R. A. 2002. Vvedenie v matematicheskuyu statisticheskuyu fiziku [Introduction to mathematical statistical physics]. M., MCNMO, 111.
7. Pastur L. A. 1974. Spektral'naya teoriya uravnenij Kirkvuda-Zal'cburga v konechnom ob'eme [The spectral theory of the Kirkwood – Salzburg equations within the corresponding limits]. Teoret. i matem. fizika, 18(2): 233–242.
8. Ruelle D. 1969. Statistical Mechanics. Rigorous Results. New York-Amsterdam: W. A. Benjamin, Inc, 367.
9. Gallavotti G., Miracle-Sole S. 1967. Statistical Mechanics of Lattice Systems. Commun. Math. Phys. 5: 317–323.
10. Gallavotti G. Statistical mechanics. 1999. Roma: Dipartimento di Fisica Università di Roma, 349.
11. de Lacheisserie E., Gignoux D., Schlenker M. 2005. Magnetism: Fundamentals. Springer, 1: 315–317.
12. Kirkwood J. G., Salsburg Z. 1953. W. The statistical mechanical theory of molecular distribution functions in liquids. Discussion of the Faraday Society. 15(1): 28–34.
13. Stohr J., Siegmann H. C. 2006. Magnetism: From Fundamentals to Nanoscale Dynamics. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 290–293.

Получена 01.02.2020

Вирченко Юрий Петрович – доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры теоретической и математической физики института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета

ул. Победы, 85, г. Белгород, Россия, 308015

E-mail: virch@bsu.edu.ru

Московченко Екатерина Юрьевна – аспирантка первого года обучения кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета

ул. Победы, 85, г. Белгород, Россия, 308015

E-mail: 1079708@bsu.edu.ru