



УДК 517.9

DOI: 10.18413/2075-4639-2018-50-1-40-46

ОБОБЩЕННЫЙ ОПЕРАТОР ВЕКУА-ПОМПЕЙЮ**THE VEKUA– POMPEIU GENERALIZED OPERATOR****О.В. Чернова****O.V. Chernova**

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

Belgorod State University, 85 Pobedy St, Belgorod, 308015, Russia

E-mail: chernova_olga@bsu.edu.ru

Аннотация

В статье рассматривается обобщенный интеграл Векуа–Помпейю в классе вектор–функций, удовлетворяющих условию Гельдера с некоторым весом. Доказано, что такой интеграл при некоторых условиях на плотность непрерывно дифференцируем и является решением обобщенной системы Коши–Римана. Сформулирована теорема о том, что при определенных условиях на показатель Гельдера соответствующий интегральный оператор ограничен в пространствах Гельдера с весом, обратим, и обратным к нему служит обобщенный оператор системы Коши–Римана.

Abstract

In the article we consider the generalized integral of the Vekua–Pompeiu integral for vector functions from Hölder continuously differentiable class with a weight. It is proved that this integral under certain conditions on a density is continuously differentiable, and it is a solution of the generalized Cauchy–Riemann system. A theorem is declared that for some restrictions on a Hölder power the corresponding integral operator is bounded in Hölder spaces with a certain weight, it is invertible and its inverse is generalized operator Cauchy–Riemann system.

Ключевые слова: обобщенный интеграл Векуа–Помпейю, весовое пространство Гельдера, система Коши–Римана, компактное вложение.

Keywords: The Vekua–Pompeiu generalized integral, weighted Hölder space, the Cauchy–Riemann system, compact embedding.

Функционально–теоретические методы и интегральные представления различных классов функций играют важную роль при исследовании многих краевых задач теории функции комплексного переменного (см., например, [1,2,3]). Настоящая работа связана со специальной системой дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка, обобщающей систему Коши–Римана, для исследования которой широко используются упомянутые методы.

Пусть S –комплексная плоскость. Рассмотрим неоднородное уравнение Коши–Римана

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = f, \quad (1)$$

где использовано обычное обозначение

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right).$$



Хорошо известно [2, стр. 29], что если функция f непрерывно дифференцируема по x, y и удовлетворяет оценке

$$|f(z)| = O(|z|^\delta), \text{ при } z = x + iy \rightarrow \infty \tag{2}$$

с некоторым $\delta < -1$, то функция

$$u(z) = -\frac{1}{\pi} \int_C \frac{f(t) d_2 t}{t-z},$$

где здесь и ниже $d_2 t$ означает элемент площади, непрерывно дифференцируема и является решением уравнения (1). Отметим, что оценка (2) предполагается справедливой и для l -вектор-функций.

Интеграл в правой части этого равенства носит название Векуа-Помпейю. Удобно его снабдить дополнительным множителем $\frac{1}{2i}$, полагая

$$(Tf)(z) = -\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(t) d_2 t}{t-z},$$

тогда имеем равенство $LTf = f$ по отношению к оператору

$$L = \frac{\partial}{\partial y} - i \frac{\partial}{\partial x} = -2i \frac{\partial}{\partial \bar{z}}.$$

Пусть матрица $J \in \mathbb{C}^{l \times l}$ постоянна и ее собственные значения лежат в верхней полуплоскости, $\text{Im } \lambda > 0$. С каждым комплексным числом $z = x + iy \in \mathbb{C}$ свяжем $l \times l$ -матрицу

$$z_J = x \cdot 1 + y \cdot J, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

собственными значениями которой служат числа $x + \lambda y$, где $\lambda \in \sigma(J)$, а 1 – единичная матрица. Отметим важное матричное соотношение

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|\lambda|=1} t_J^{-1} dt_J = 1, \tag{3}$$

где, как и выше, 1 – единичная матрица.

Введем обобщенный интеграл Векуа-Помпейю по формуле

$$(T_J f)(z) = -\frac{1}{2\pi i} \int_C (t-z)_J^{-1} f(t), \tag{4}$$

По отношению к оператору

$$L_J = \frac{\partial}{\partial y} - J \frac{\partial}{\partial x} \tag{5}$$

справедлив следующий результат.

Лемма 1. Пусть l -вектор-функция $f(z)$ непрерывно дифференцируема по x, y и удовлетворяет оценке (2) с некоторым $\delta < -1$. Тогда l -вектор-функция $\phi = T_J f$ также непрерывно дифференцируема и является решением уравнения $L_J \phi = f$.

Доказательство. Пусть z меняется в некотором круге $|z - z_0| < r$. Если функция f обращается в нуль в этом круге, то равенство (4) можно дифференцировать под знаком интеграла и соотношение

$$(L_J T_J f)(z) = f(z) \tag{6}$$

для $|z - z_0| < r$ проверяется непосредственно. Поэтому не ограничивая общности можно считать, что функция f имеет компактный носитель. Тогда существует такое $R > 0$, что $f(t+z) = 0$ при $|t| \geq R$ и $|z - z_0| < r$. Поэтому равенство (4) для $\phi = T_J f$ можно переписать в форме

$$\phi(z) = -\frac{1}{2\pi i} \int_C t_J^{-1} f(t+z) d_2 t,$$



и его можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$\frac{\partial \phi(z)}{\partial x} = -\frac{1}{2\pi i} \int_C t_J^{-1} \frac{\partial f}{\partial x}(t+z) d_2 t, \quad \frac{\partial \phi(z)}{\partial y} = -\frac{1}{2\pi i} \int_C t_J^{-1} \frac{\partial f}{\partial y}(t+z) d_2 t, \quad (7)$$

Рассмотрим двумерный сингулярный интеграл

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C t_J^{-2} f(z+t) d_2 t \quad (8)$$

понимаемый как предел при $\varepsilon \rightarrow 0$ интегралов по $\{|t| \geq \varepsilon\}$. Поскольку

$$\int_{|t|=1} t_J^{-2} d_1 t = 0, \quad (9)$$

где $d_1 t$ есть элемент длины дуги, необходимое условие существования таких интегралов выполнено. В справедливости равенства (9) проще всего убедиться с помощью функции

$$\chi(\lambda) = \int_0^{2\pi} (\cos \theta + \lambda \sin \theta)^{-2} d\theta,$$

аналитической в верхней полуплоскости $Im \lambda > 0$ [4].

Полагая $t = t_1 + it_2$, $z = x_1 + ix_2$ и пользуясь формулой Грина, получим:

$$\begin{aligned} \int_{|t| \geq \varepsilon} t_J^{-1} \frac{\partial f}{\partial x_k}(z+t) d_2 t &= \int_{|t| \geq \varepsilon} t_J^{-1} \frac{\partial f}{\partial t_k}(z+t) d_2 t = \\ &= \int_{|t| \geq \varepsilon} \frac{\partial}{\partial t_k} (t_J^{-1}) f(t+z) d_2 t - \int_{|t|=\varepsilon} n_k(t) t_J^{-1} f(t+z) d_1 t. \end{aligned}$$

Здесь $n = n_1 + in_2 = -t/|t|$ есть единичная внешняя нормаль к области $|t| > \varepsilon$.

Очевидно,

$$\frac{\partial}{\partial t_1} (t_J^{-1}) = -t_J^{-2}, \quad \frac{\partial}{\partial t_2} (t_J^{-1}) = -t_J^{-2} J.$$

Поэтому переходя в предыдущих равенствах к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, в обозначениях (7) получим

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = -F(z) - \sigma_1 f(z), \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = -JF(z) - \sigma_2 f(z), \quad (10)$$

где коэффициенты $\sigma_k \in \mathbf{C}^{1 \times 1}$ определяются формулами

$$\sigma_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t|=1} t_J^{-1} t_1 d_1 t, \quad \sigma_2 = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t|=1} t_J^{-1} t_2 d_1 t.$$

Поскольку $t_1 d_1 t = dt_2$, $t_2 d_1 t = -dt_1$, разность $t_2 d_1 t - J t_1 d_1 t = -dt_J$. С учетом (3) отсюда

$$\sigma_2 - J\sigma_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{|t|=1} t_J^{-1} dt_J = 1,$$

что совместно с (10) завершает доказательство равенства (6) и леммы.

Распространим лемму 1 на функции, которые принадлежат классу $C^\mu(K)$ на любом компакте $K \subseteq \mathbf{C}$ и имеют поведение (2) на бесконечности с фиксированным $\delta \in \mathbf{R}$. С этой целью для неограниченного множества E на плоскости обозначим $C_\mu^\mu(E, \infty)$ класс функций, удовлетворяющих на этом множестве условию Гельдера с показателем μ , т.е. функций φ с конечной полунормой

$$[\varphi]_\mu = \sup_{z_1 \neq z_2} \frac{|\varphi(z_1) - \varphi(z_2)|}{|z_1 - z_2|^\mu},$$

где верхняя грань берется по точкам $z_j \in E$.



Нетрудно видеть, что эти функции удовлетворяют (2) с $\delta = \mu$. Исходя из произвольного δ , обозначим $C_\delta^\mu(E, \infty)$ класс функций φ , для которых $\psi(z) = (1+|z|)^{\mu-\delta}\varphi(z) \in C_\mu^\mu(E, \infty)$. Очевидно, функция φ имеет поведение (2) на бесконечности и относительно нормы

$$|\varphi| = \sup_{z \in E} |(1+|z|)^{-\delta}\varphi(z)| + [\psi]_\mu$$

введенное пространство банахово.

Если множество E является замкнутой областью \bar{D} , то под $C_\delta^{1,\mu}(\bar{D}, \infty)$ понимается класс непрерывно дифференцируемых в D функций φ , для которых

$$\varphi \in C_\delta^\mu, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y} \in C_{\delta-1}^\mu. \tag{11}$$

Заметим, что семейство пространств C_δ^μ монотонно убывают по μ и возрастают по δ относительно вложения. Эти пространства подробно описаны в [3 стр 77, 83] (в несколько более общей ситуации нескольких особых точек). Отметим несколько их свойств.

Лемма 2. (а) Пусть $0 < 2r < R$ и $B = \{|z| \leq R\}$, $K = \{r \leq |z| \leq R\}$, так что вместе с кругом B последовательность колец $\{2^i z, z \in K\}$, $i = 0, 1, \dots$, покрывает всю плоскость. В этих обозначениях функция $\varphi \in C_0^\mu(\mathbb{C}, \infty)$ тогда и только тогда, когда она принадлежит классу $C^\mu(B)$ для любого R и норма

$$|\varphi| = |\varphi|_{C^\mu(B)} + \sup_{i \geq 0} |\varphi(2^i z)|_{C^\mu(K)}$$

конечна. При этом данная норма эквивалентна норме пространства C_0^μ .

(б) Пусть $r < 0$ и частные производные

$$\varphi_1 = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \varphi_2 = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$$

принадлежат классу $C_{\delta-1}^\mu(\mathbb{C}, \infty)$. Тогда функция $\varphi \in C_\delta^{1,\mu}(\mathbb{C}, \infty)$ и справедлива оценка

$$|\varphi|_{C_\delta^\mu} \leq C(|\varphi(0)| + |\varphi_1|_{C_{\delta-1}^\mu} + |\varphi_2|_{C_{\delta-1}^\mu}).$$

Сформулируем теперь основной результат для операторов (4), (5). Предварительно заметим, что по определению (11) дифференциальный оператор L_J ограничен $C_\delta^{1,\mu}(\mathbb{C}, \infty) \rightarrow C_{\delta-1}^\mu(\mathbb{C}, \infty)$.

Теорема. При $-1 < \delta < 0$ интегральный оператор T_J ограничен $C_{\delta-1}^\mu(\mathbb{C}, \infty) \rightarrow C_\delta^{1,\mu}(\mathbb{C}, \infty)$, обратим и обратным к нему служит L_J .

Доказательство. Пусть $f \in C_{\delta-1}^{1,\mu}$ и $\phi = T_J f$. Рассмотрим сингулярный оператор

$$(S_J^2 f)(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} (t-z)_J^{-2} \varphi(t) d_2 t,$$

который может быть записан и в форме (8). Согласно лемме 1 частные производные функции ϕ связаны с функцией $F = S_J^2 f$ соотношениями (7). Поэтому с учетом леммы 2(б) утверждение теоремы об ограниченности оператора T_J сводится к доказательству ограниченности сингулярного оператора S_J^2 в пространстве $C_{\delta-1}^\mu$.

Покажем, что этот оператор ограничен в C_δ^μ при $-2 < \delta < 0$. В основе лежит известная теорема Корна–Жиро [5]. Пусть $0 < r_0 < r$ и $B_0 = \{|z| \leq r_0\}$, $B = \{|z| \leq r\}$. Тогда по этой теореме для $\varphi \in C^\mu(B)$ сингулярный интеграл



$$\phi_0(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_B (t-z)_J^{-2} \varphi(t) d_2 t, \quad z \in B_0,$$

определяет функцию $\phi_0 \in C^\mu(B_0)$ с соответствующей оценкой

$$|\phi_0|_{C^\mu(B_0)} \leq C |\varphi|_{C^\mu(B)}, \quad (12)$$

где постоянная $C > 0$ зависит только от r_0 и r .

Применим этот факт к интегралу $\phi = S_J^2 \varphi$ с плотностью $\varphi \in C_\delta^\mu(\mathbf{C}, \infty)$. Разобьем его на сумму $\phi_0 + \phi_1$, где ϕ_0 определяется интегрированием по B . Очевидно, функция ϕ_1 непрерывно дифференцируема в круге и для нее справедлива очевидная оценка

$$|\phi_1|_{C^\mu(B_0)} \leq C \sup_{|z| \geq r} [|z|^{-\delta} |\varphi(z)|],$$

где здесь и ниже C означает различные положительные постоянные, не зависящие от φ . В результате совместно с (12) приходим к оценке

$$|\phi|_{C^\mu(B_0)} \leq C |\varphi|_{C_\delta^\mu(\mathbf{C}, \infty)}.$$

Поэтому достаточно убедиться, что ϕ принадлежит классу $C_\delta^\mu(B_{r'}, \infty)$ в области $B_{r'} = \{|z| \geq r_0\}$ с соответствующей оценкой норм.

В соответствии с определением пространства C_δ^μ дело сводится к доказательству того, что для $\varphi \in C_0^\mu(B_{r'}, \infty)$ функция

$$\psi(z) = \int_{|t| \geq r_0} \frac{|t|^r}{|z|^r} (t-z)_J^{-2} \varphi(t) d_2 t, \quad |z| \geq r, \quad (13)$$

принадлежит классу $C_0^\mu(B', \infty)$, где $B' = \{|z| \geq r\}$, с соответствующей оценкой

$$|\psi|_{C_0^\mu(B', \infty)} \leq C |\varphi|_{C_0^\mu(B_{r'}, \infty)}. \quad (14)$$

С этой целью выберем положительные R_0, R по условию $2r < R < R_0$ и положим $K = \{r \leq |z| \leq R\}$, $K_0 = \{r_0 \leq |z| \leq R_0\}$. На основании теорема Корна–Жиро аналогично предыдущему убеждаемся, что

$$|\psi|_{C^\mu(K)} \leq C [\sup_i |\varphi(t)| + |\varphi|_{C^\mu(K_0)}]. \quad (15)$$

Согласно (15) для любого $i = 1, 2, \dots$ можем записать

$$\psi(2^i z) = \int_{|t| \geq 2^{-i} r_0} \frac{|t|^\delta}{|z|^\delta} (t-z)_J^{-2} \varphi(2^i t) d_2 t, \quad z \in K,$$

Поэтому имеем аналогичную (15) оценку

$$|\psi(2^i z)|_{C^\mu(K)} \leq C [\sup_i |\varphi(t)| + |\varphi(2^i t)|_{C^\mu(K_0)}],$$

так что и

$$\sup_i |\psi(2^i z)|_{C^\mu(K)} \leq C [\sup_i |\varphi(t)| + \sup_i |\varphi(2^i t)|_{C^\mu(K_0)}],$$

В соответствии с леммой 2(а) отсюда следует оценка (15), завершающая доказательство ограниченности оператора S_J^2 .

Что касается второй части теоремы, то пусть $\phi \in C^{1,\mu}(\mathbf{C}, \infty)$ и $f = L_J \phi$. Тогда в силу (6) имеем равенство

$$\phi = T_J f + \phi_0, \quad (16)$$

где функция $\phi_0 \in C^{1,\mu}(\mathbf{C}, \infty)$ удовлетворяет уравнению $L_J \phi_0 = 0$, т.е. является J -аналитической на всей плоскости. Поскольку она исчезает на бесконечности, в действительности она тождественно равна нулю. Этот факт составляет аналог теоремы



Лиувилля для рассматриваемых вектор–функций и с помощью формулы Коши доказываемся совершенно аналогично.

В самом деле, при $|z| > r > 0$ в области $|t| > r$ можем к функции ϕ_0 применить формулу Коши

$$\phi_0(z) = \int_{|t|=r} dt_J (t-z)_J^{-1} \phi_0(t) dt.$$

При $r \rightarrow 0$ интеграл здесь стремится к нулю, так что $\phi_0(z) = 0$ для всех z .

Итак, (16) в действительности означает равенство $\phi = T_J f$, где напомним $f = L_J \phi$. Таким образом, вместе с (6) имеем аналогичное соотношение $T_J L_J \phi = \phi$, справедливое для любых $\phi \in C_\delta^{1,\mu}$, $-1 < \delta < 0$, так что операторы T_J и L_J действительно взаимно обратны.

Интегральный оператор (4) можно ввести и для областей D на плоскости, ограниченных гладким контуром Γ . Однако вопрос об его ограниченности в пространствах C^μ и C_δ^μ требует определенной гладкости Γ . Чтобы обойти этот вопрос, воспользуемся оператором P продолжения функций $\phi \in C(\overline{D})$ на всю плоскость. Этот оператор построим сначала локально для функций ϕ , обращающихся в нуль вне некоторой окрестности фиксированной граничной точки $t_0 = x_0 + iy_0 \in \Gamma$.

При достаточно малом $\rho > 0$ пересечение Γ с кругом $B_\rho = \{|z - t_0| < \rho\}$ представляет собой гладкую дугу, которая является графиком некоторой функции $f \in C^1[a, b]$, т.е. либо графиком $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, либо графиком $x = f(y)$, $a \leq y \leq b$. Пусть для определенности имеет место первый случай, так что $y_0 = f(x_0)$, и $\varepsilon > 0$ выбрано столь малым, что область D_0 , определяемая в декартовых координатах $z = x + iy$ неравенствами $|x - x_0| < \varepsilon$, $|y - f(x)| < \varepsilon$, содержится в круге B_ρ . Граница области $D_0 \cap D$ составлена из гладкой дуги Γ_0^+ , определяемой уравнением $y = f(x)$, $|x - x_0| \leq \varepsilon$, и соответствующей кусочно–гладкой дуги Γ_0^- , которая за исключением своих концов содержится в D .

Не ограничивая общности можно считать, что f продолжена до функции $f \in C^1(\mathbf{R})$ с компактным носителем. Рассмотрим преобразование $\xi + i\eta = \alpha(x + iy)$ плоскости на себя по формуле $\xi = x$, $\eta = y - f(x)$. Очевидно, оно обратимо и обратное преобразование $\beta = \alpha^{-1}$ действует по аналогичной формуле $x = \xi$, $y = \eta + f(\xi)$. В окрестности ∞ эти преобразования являются тождественными. Поскольку они непрерывно дифференцируемы, отсюда следует, что для некоторой постоянной $M > 1$ и любых точек $z_1 \neq z_2$ выполнены неравенства

$$\frac{1}{M} \leq \frac{|\alpha(z_1) - \alpha(z_2)|}{|z_1 - z_2|} \leq M. \tag{17}$$

Пусть теперь функция ϕ принадлежит $C^\mu(D \cap D_0)$ и обращается в нуль в окрестности дуги Γ_0^- . Положим $\psi(\zeta) = \phi[\beta(\zeta)]$, $\zeta \in \alpha(D \cap D_0)$, и продолжим ее до функции $\tilde{\psi}$ сначала нулем на соответствующую полуплоскость, а затем на всю плоскость по правилу $\tilde{\psi}(\xi + i\eta) = \tilde{\psi}(\xi - i\eta)$. Тогда равенство

$$(P_0 \phi)(z) = \tilde{\psi}[\alpha(z)]$$

определяет требуемый оператор продолжения, поскольку сужение функции $\tilde{\phi} = P_0 \phi$ на $D \cap D_0$ совпадает с ϕ .

Легко видеть, sup– нормы функций ψ и $\tilde{\psi}$ совпадают, а их полунормы

$$[\phi]_\mu = \sup_{z_1 \neq z_2} \frac{|\phi(z_1) - \phi(z_2)|}{|z_1 - z_2|^\mu}$$



связаны соотношением $[\tilde{\psi}]_{\mu} \leq 2[\psi]_{\mu}$. В силу (17) имеем аналогичные неравенства $[\psi]_{\mu} \leq M[\varphi]_{\mu}$ и $[\tilde{\varphi}]_{\mu} \leq M[\tilde{\psi}]_{\mu}$. В результате приходим к оценке

$$|P_0\varphi|_{C^{\mu}(C)} \leq 2M^2 |\varphi|_{C^{\mu}(D \cap D_0)}. \quad (18)$$

Из (18) и построения видно также, что

$$(P_0\varphi)(z) = 0, \quad |z - z_0| \geq M^2\rho. \quad (19)$$

В силу компактности контур Γ можно покрыть конечным числом областей D_1, \dots, D_n того же типа, что и D_0 . Пусть P_k – оператор продолжения, отвечающий D_k . Выберем разбиение единицы – семейство функций $\chi_k \in C^1(D_k)$, $1 \leq k \leq n$, и $\chi \in C^1(D)$, таких, что $\chi_k = 0$ в окрестности ∂D_k , функция $\chi = 0$ в окрестности Γ и сумма

$$\sum_{k=1}^n \chi_k(z) + \chi(z) = 1, \quad z \in D.$$

Тогда формула

$$P\varphi = \sum_{k=1}^n P_k(\chi_k\varphi) + \chi\varphi$$

определяет требуемый оператор продолжения, поскольку для $z \in D$ имеем равенства $(P_k\chi_k\varphi)(z) = (\chi_k\varphi)(z)$ и, следовательно,

$$(P\varphi)(z) = \sum_{k=1}^n (\chi_k\varphi)(z) + (\chi\varphi)(z) = \varphi(z).$$

В заключение автор выражает признательность своему научному руководителю проф. А.П. Солдатову за ценные советы и рекомендации по написанию и оформлению статьи.

Список литературы References

1. Begehr H.G.W. 1994. Complex Analytic Methods for Partial Differential Equations. Singapore-New Jersey-London-Hong Kong.-World Scientific.
2. Векуа И.Н. 1988. Обобщенные аналитические функции., 2-е изд., М.,Наука.
Vekua I. N. 1988. Generalized analytic functions, 2nd ed., M., Nauka.
3. Солдатов А.П. 2017. Сингулярные интегральные операторы и эллиптические краевые задачи. Современные проблемы математики. Фундаментальные направления, 63: 1-189.
Soldatov A.P. 2017. Singular integral operators and elliptic boundary value problems. Modern problems of mathematics. Fundamental directions, 63: 1-189.
4. Ващенко О.В., Солдатов А.П. 2006. Интегральное представление решений обобщенной системы Бельтрами. Научные ведомости, БелГУ, выпуск 2, № 1(21), серия «Информатика и прикладная математика»: 3-6.
Vaschenko O.V., Soldatov A.P. 2006. An integral representation of solutions of the generalized Beltrami system. Scientific bulletins, BelGU, Issue 2, №.1 (21), "Informatics and Applied Mathematics": 3-6.
5. Bers L., John A. and Schechter M. 1964. Partial Differential Equations. Interscience Publishers. New York London Sydney.